

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- La aplicación de CANELYS debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de extractos vegetales de uso agrícola de Categoría Toxicológica III (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- CANELYS no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y aireado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Ojos: Lavar con abundante agua.
- Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
- Inhalación: Retirarse para respirar aire fresco.
- Ingestión: Busque asistencia médica.

- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente muéstrele una copia de esta etiqueta.

NOTA AL MEDICO:

Toxicología: DL50 Oral: >2000 mg./Kg. de peso corporal
DL50 Dermal: >2000 mg./Kg. de peso corporal
Antídoto: Seguir tratamiento sintomatológico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.
- No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

CANELYS®

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Extracto de Canela.....70% p/p
Aditivos..... c.s.p. 100% p/p

PBUA-N° 293-SENASA

Titular del registro:

ATLANTICA AGRICOLA PERU S.A.C.
Av. Ancon Nro. 106 - Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque – Perú
Telefax: (74) 620 375

Formulado por: Atlántica agrícola S.A.

Dirección : Calle Corredera, 33, 03400 Villena, Alicante, España
Telefono: 00 34 965800358
Fax: 00 34 965800323
Web: <http://www.atlanticaagricola.com/>



Distribuido por:

ATLANTICA AGRICOLA PERU S.A.C.
Av. Ancon Nro. 106 - Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque – Perú
Telefax: (51 1) 440 6318; Fax: 441-1698.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Contenido Neto: 25 litros

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Modo de acción: CANELYS Es un fungicida-acaricida botánico capaz de controlar ácaros y botrytis en diferentes cultivos.
- Debe aplicarse en aspersión (preferiblemente) o en lavado garantizando una muy buena cobertura en toda la superficie foliar (haz y envés).
- Por tratarse de un producto biodegradable y de baja persistencia debe ser aplicado de forma preventiva por lo menos una vez a la semana de forma regular y continua.
- En cualquier momento de desarrollo de la planta, preferiblemente antes de la aparición de síntomas o signos de la enfermedad o en su defecto cuando estos comiencen su aparición.
- Es muy efectivo en el marco de programas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC), pues previene y controla la aparición de éstas enfermedades.
- En una medida para pesticidas, medir la cantidad recomendada del producto en un poco cantidad de agua, agitar hasta lograr una mezcla uniforme, luego echar en el cilindro de aplicación.
- Es preferible usar un coadyuvante convencional para mejorar la humectación en los tejidos vegetales.
- Asperjar con buen volumen e agua a fin de lograr una cobertura uniforme.
- Agitese antes de usar.

“Consulte con un Ingeniero Agronomo”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/cil de 200L.	LMR (ppm)	PC (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Alcachofa	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	0.50	Exento	0
Esparrago	“Mancha foliar”	<i>Cercospora asparagi</i>	0.50	Exento	0
Palto	“Araña roja”	<i>Olygonychus punicae</i>	0.50	Exento	0
Pimiento	“Botritis”	<i>Botrytis cinerea</i>	0.50	Exento	0
Vid	“Oidium”	<i>Erysiphe necator</i>	1.00	Exento	0
Café	“Roya del Café”	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.3	Exento	0

LMR: Límite Máximo de Residuos de Plaguicidas | PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La frecuencia y época de aplicación dependerá del nivel de la infección del patógeno o nivel de la plaga, según sea el caso.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área aplicada después de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede ser utilizado en programas de manejo integrado de plagas (MIP) y de manejo integrado de cultivos (MIC)

FITOTOXICIDAD

CANELYS no presenta fitotoxicidad en los cultivos ensayados utilizando las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

