

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de CUIDADO, No ingerir.

Evite contacto con la piel y la ropa.

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUIMICO: Dinitroaniline

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos como mínimo.

En caso de contacto con los ojos: Lavar bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.

En caso de ingestión: Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No inducir al vomito. No administrar nada a una persona inconsciente.

En caso de Inhalación: Mover a la persona a un área ventilada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si la respiración es dificultosa, ofrecer respiración artificial. Consiga atención médica si persiste la dificultad respiratoria.

Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático o de soporte. Se recomienda llevar la etiqueta.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita) INTEROC S.A. 243-2233

ESSALUD: 117 (línea gratuita)

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado de este envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Toxico para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DIACONO

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)

COMPOSICION:

Flumetralin..... 250 g /L

Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° _____-SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú



**Formulador:
NINGBO SUNJOY
AGROSCIENCE CO., LTD.**
1165 Beihai Road, Chemical
Industry Zone of Ningbo,
Zhejiang Province - China

Contenido neto: 5 L

Número de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DIACONO es un regulador de crecimiento de origen sintético, que ayuda al control de los brotes de tabaco. Actúa inhibiendo de forma selectiva los microtúbulos de las plantas y los protozoos.

Flumetralin está en la clase 2,6dinitroanilina de productos químicos. Flumetralin es un regulador de crecimiento de las plantas, utilizado en tabaco para el control de la yema de crecimiento axilar (lechón).

Para la aplicación calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretenda asperjar. Se coloca en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y se adiciona la cantidad de DIACONO de acuerdo a la dosis recomendada, luego agitar la mezcla. Finalmente adicionar el resto de agua y aplicar el producto.

CUADRO DE USO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	CONTROL	Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
		%	(L/200L)		
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Brotes de tabaco	0.5 - 1	2	28	0.03

P.C. : Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar DIACONO (i.a. Flumetralin) en una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

Se aplicará cuando la mayor parte de las plantas estén en estado de botones alargados y abertura de las primeras flores

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta. Se recomienda realizar pruebas de fitotoxicidad en cultivos con variedades susceptibles

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del registro garantiza que las características del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas”.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

