

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Conservar en envases originales, etiquetados y herméticamente cerrados.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante la mezcla y aplicación: botas de jefe, mascarilla, caretas, gafas y guantes impermeables.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa y bañese con agua y jabón.
- Durante la aplicación evitar el contacto directo con el producto.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**GRUPO QUÍMICO: Cyanoimidazole**

- En caso de ingestión accidental, NO inducir al vomito. No dar de beber ningún tipo de líquido a una persona inconsciente. Acudir al médico.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, y manténgase en reposo.
- Si hay contacto con la piel quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Si hay contacto con los ojos, mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos.
- Nota al médico: En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y entregue una copia de esta etiqueta. No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX: 0800 - 13040 (Línea gratuita) o**  
**ESSALUD: 423-7600 (Línea gratuita)**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No re utilizar los envases ni enterrarlos.
- No disponer con residuos municipales.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No aplicar en menos de 5m de fuentes de agua.
- Tóxico para el ganado. No permita el ingreso de animales durante la aplicación.
- Restringir el uso a zonas de cultivo; no aplicar en canales de riego o cerca de vegetación ribereña, áreas protegidas o silvestres.
- Evitar la aplicación cuando se presenten vientos fuertes.
- Al finalizar la aplicación enjuague bien el tanque con agua y aplicar todo el volumen del enjuague sobre el cultivo.

**RANMAN®**  
**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Cyazofamid.....400 g/l  
Aditivos .....c.s.p. 1 litro

**N° DE REGISTRO: PQUA N° 045 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**ISK ISHIHARA PERU S.A.**  
Leonardo Da Vinci N° 386, Lima 41  
Telf: (511) - 476 4849

**FORMULADO POR:**

**PHYTEUROP**  
53 Rue Raspail 92594 Levallois-Perret,  
Cedex - Francia

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**



**SILVESTRE PERÚ S.A.C**  
Calle Arica 242, Miraflores, Lima 18 Perú. Telf.: (511) 617- 3300

Contenido Neto : 200 Litros  
N° de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Llenar con agua (volumen/ha de acuerdo al equipo a usar) hasta un tercio del depósito, agregar la cantidad correspondiente de **RANMAN®** haciendo uso de un medidor adecuado, el cual se debe enjuagar hasta que no quede residuos del producto en las paredes del mismo, luego completar la capacidad del recipiente con agua (usar 400 a 600 L de agua/ha). Después de una ligera agitación se tiene una solución estable lista para ser aplicada.

Agitar el envase antes de usar el producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	ml/Cil	L/ha		
Papa	"Rancha o Hielo"	<i>Phytophthora infestans</i>		0.20-0.25	7	0.01
Vid	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>		0.25	30	1.5
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>		0.25	0	0.01**

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)  
\*LMR Europa / \*\*LMR USA

PC: Período de carencia(días)

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

**RANMAN®** puede ser aplicado durante el desarrollo del cultivo, en forma preventiva, hasta 3 aplicaciones sucesivas, como máximo, su efecto residual es mayor, si la última aplicación, se realiza cuando el cultivo alcanza su máximo desarrollo vegetativo.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Tampoco permitir el ingreso del ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD:**

Condiciones para realizar las mezclas:

- No mezclar con productos de reacción alcalina
- En caso de emplear agua con un pH muy alto, se debe tratar con un acidificante previo a la realización de la mezcla de plaguicida.
- Antes de realizar la mezcla probar en un envase pequeño si existe o no compatibilidad con el otro pesticida. En caso de existir incompatibilidad, realizar las aplicaciones por separado.

**FITOTOXICIDAD:**

**RANMAN®** no ha demostrado síntomas de fitotoxicidad o efectos sobre cultivos sucesivos luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



000003