

Sanmite®

20 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Pyridaben.....200 g/Kg

Aditivos.....c.s.p 1Kg

Reg. N° 204-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU

Av. José Pardo 513 Of. 701 Miraflores. Lima - Perú

Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:

NISSAN CHEMICAL CORPORATION

5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-6119 Japón.

Teléfono.: 81 (0)3-4463-8300

CONTENIDO NETO : 1 Kg.

Numero de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

® Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- El producto debe ser transportado protegido con un embalaje adecuado y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Evitar que el producto contamine fuentes de agua.
- Durante la mezcla hacer uso de guantes protectores.
- Durante la aplicación hacer uso de guantes, gafas y máscara protectora.
- No coma, beba, ni fume durante la aplicación o manipuleo.
- En caso de haber estado en contacto con el producto así como después de cada aplicación, se recomienda lavarse bien así como cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destruya el envase.
- Usar sólo el producto que viene en envases originales.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piridazinona
- En caso de inhalación se recomienda reposo, respirar aire fresco y buscar ayuda médica.
- Tras contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Tras contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de ingestión lavar inmediatamente la boca y beber abundante agua; provocar el vómito.
- Nota al médico; tratamiento sintomático (descontaminar funciones vitales), no es conocido ningún antidoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-13040 (Línea gratuita) O

ESSALUD: 411-8000 (Línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SANMITE® es un acaricida con actividad de choque y con prolongado efecto residual sobre todas las formas móviles de un amplio espectro de ácaros. En los ensayos realizados y en las aplicaciones comerciales no se ha observado resistencia cruzada con otros acaricidas comerciales.

Preparación y aplicación

Se llena con agua (volumen/ha de acuerdo al equipo a usar) hasta un tercio del depósito, se agrega la cantidad correspondiente de **SANMITE®** completando luego la capacidad del recipiente.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo una aplicación por campaña, cuando se observe la presencia de la plaga en campo o cuando este presente en un porcentaje donde afecte significativamente la cosecha. Considerar 2 campañas por año, 2 aplicaciones por campaña, con intervalo de 14 días para el cultivo de frijol o 30 días para el cultivo de arroz.

PERIODO DE REINGRESO

No hay restricciones una vez completamente secado el depósito aplicado. Se recomienda una espera de 2 horas previa verificación del completo secado del depósito aplicado.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con fungicidas, abonos foliares. No recomendamos mezclas con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	Kg/Ha	Kg/200L		
Papa	“Acaro hialino”	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20	14	0.05
Ají amarillo	“Acaro hialino”	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20	14	0.5
Limón	“Acaro del tostado”	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	0.16 - 0.24	14	0.5
	“Acaro hialino”	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20		
	“Arañita roja de los citrus”	<i>Panonychus citri</i>	-	0.20 - 0.30		
Pepino dulce	“Acaro hialino”	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20	14	0.1
Espárrago	“Arañita roja”	<i>Tetranychus sp.</i>	0.15 - 0.30	-	14	0.05
Mandarina	“Acaro del tostado”	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	0.16 - 0.24	14	0.5
	“Acaro hialino”	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20		
	“Arañita roja de los citrus”	<i>Panonychus citri</i>	-	0.20 - 0.30		
Naranja	“Acaro del tostado”	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	0.16 - 0.24	14	0.5
	“Acaro hialino”	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20		
	“Arañita roja de los citrus”	<i>Panonychus citri</i>	-	0.20 - 0.30		
Manzano	“Arañita roja”	<i>Tetranychus urticae</i>	-	0.30 - 0.40	14	0.5
Fresa	“Arañita roja”	<i>Tetranychus urticae</i>	-	0.20 - 0.25	7	0.05
Palto	“Acaro”	<i>Oligonychus punicae</i>	-	0.15 - 0.20	40	0.5
Tomate	“Mosca blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	-	0.25	7	0.3
Frijol	“Mosca blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	-	0.25	7	0.05
Arroz	“Acaro”	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	-	0.20 - 0.25	45	0.05
Vid	“Arañita roja”	<i>Tetranychus urticae</i>	-	0.20	28	0.5

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de Carencia (días)

