

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

##### Grupo Químico: Fosfometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**CICOTOX 0-800 - 1-3040 (gratuito)**  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

## 480 SL

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

#### HERBICIDA AGRICOLA

#### Concentrado Soluble (SL)

##### Composición:

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos..... csp 1 L

Registro PQUA N° 1454 - SENASA

##### Titular de Registro:

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**

Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.

Teléfonos: + 51 -1 - 222-2795

##### Formulado por:

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**

Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**GENERIC**  
your exclusive agrochemical partner

##### Importado y Distribuido por:

**SANIVEG PERU S.A.C.**

Av. San Jenaro 235 - Urb. Industrial Puente Piedra -

Puente Piedra - Lima - Perú.

Teléfono: + 51 - 1 - 016371269

Celular: + 51 - 959292596

##### Lote N°.

**F. de Form.**

**F. de Venc.**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**Contenido Neto: 60 L**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

##### Cuadro de usos:

| CULTIVO        | Plagas                |                             | Dosis  |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------|------|--------------|--------------|
|                | Nombre común          | Nombre técnico              | L/200L | L/Ha |              |              |
| ESPARRAGO      | Gramma china          | <i>Sorghum halepense</i>    | -      | 2.0  | 5            | 0.1          |
|                | Coquito               | <i>Cyperus rotundus</i>     |        |      |              |              |
|                | Gramma dulce          | <i>Cynodon dactylon</i>     |        |      |              |              |
|                | Cadillo               | <i>Cenchrus echinatus</i>   |        |      |              |              |
|                | Yuyo                  | <i>Amaranthus dubius</i>    |        |      |              |              |
|                | Verdolaga             | <i>Portulaca oleracea</i>   |        |      |              |              |
|                | Moco de pavo          | <i>Echinochloa colonum</i>  |        |      |              |              |
|                | Amor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |        |      |              |              |
|                | Capulí                | <i>Nicandra physaloides</i> |        |      |              |              |
|                | Rabo de zorro         | <i>Setaria verticillata</i> |        |      |              |              |
| MANGO          | Pata de gallina       | <i>Eleusine indica</i>      | 2.0    | 3.2  | N.D.         | 0.2          |
|                | Amor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |        |      |              |              |
|                | Rabo de zorro         | <i>Setaria sp.p.</i>        |        |      |              |              |
|                | Coquito o grama dulce | <i>Cyperus rotundus</i>     |        |      |              |              |
| PALTO          | Pata de gallina       | <i>Eleusine indica</i>      | 2.0    | 2.8  | N.D.         | 0.2          |
|                | Amor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |        |      |              |              |
|                | Rabo de zorro         | <i>Setaria sp.p.</i>        |        |      |              |              |
|                | Coquito o grama dulce | <i>Cyperus rotundus</i>     |        |      |              |              |
| CAÑA DE AZÚCAR | Gramma                | <i>Leptochloa univervia</i> | 2.0    | 3.4  | N.D.         | 2.0          |
|                | Gramma china          | <i>Sorghum halepense</i>    |        |      |              |              |
|                | Rabo de zorro         | <i>Setaria sp.p.</i>        |        |      |              |              |
|                | Coquito o grama dulce | <i>Cyperus rotundus</i>     |        |      |              |              |
|                | Verdolaga             | <i>Portulaca oleracea</i>   |        |      |              |              |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenia.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** compatible con otros herbicidas pre emergentes.

#### FITOTOXICIDAD:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

