

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**
Durante la época recomendada en una pequeña cantidad de agua, removiendo bien y completando el volumen de aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

CAMPO - SATO 767 SG debe aplicarse sobre maizales que no hayan alcanzado el estado de Rocteryo/fluoracitr. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo 12 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al campo después de 24 horas

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros herbicidas pre emergentes

FITOTOXICIDAD

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda utilizar el producto con las paños verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitarla deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Triax de Agostini garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las arrojadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y

• No consumir aguas, ríos, estuarios o arroyos con las siguientes características:
• No consumir las fuentes de agua con las resacas de la explotación o sobrepasos de vertidos.
• No consumir las fuentes de agua con las resacas de la explotación o sobrepasos del producto.
• No consumir una bandeja de no explotación hasta después de 60 días de al menos 3 meses de explotación.
• Prohibido usar los ríos domésticos, ríos y ríos sin ríos. No permitir animales en el área zanjada.
• El operador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la defluencia.
• El caso de drenaje, riego y productos depositados en los filos dedicados por los ríos de drenaje locales para el río.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis (l/ha)	P.C (dias)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ESCARBAGO	Garrapa china	Scaphium halbeanae	2	5	0.1
	Chupado	Carpodacus rosalia			
	Garrapa dulce	Chrysomelids			
	Casillo	Cerodictyon			
	Voyo	Amaranthus dubius			
	Verdelaga	Peridictyon			
	Moco de bazo	Peridictyon			
	Amor seco	Peridictyon			
	Capulí	Peridictyon			
	Rabo de zorra	Peridictyon			
Pala de gallina	Peridictyon				

LMR: Limite Máximo de Resíduos

PC: Período de Carençias



Medidas en cms.

CAMPO - SATO 757 SG
PLAGUICIDA QUIMICOS DE USO AGRICOLA

PLAGUICIDA QUIMICOS DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

GRANULO SOLUBLE - (SG)

Composición Química:

Glyphosate monoammonium salt	757 g/Kg
Aditivos	csp 1 Kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14, Perú.
Teléfonos: 00 51 -1 - 222-2795

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengleng Street
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86-574 - 87301088
+ 86 - 574 - 87301088
+ fax: + 86 - 574 - 87268208



GENERIC
捷力克化工
NINGBO JIALI CHEMICAL CO., LTD.

Contenido Neto: **4 Kg**

Lote N°.
F. de Form
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVE

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**