

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

* Este producto es ligeramente peligroso, no agresivo.

* Causa irritación moderada en las ojos.

* No conter, beber o lamer durante las operaciones de mezcla y aplicación.

* Utilice ropa protectora dura y resistente a la abrasión y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

* Debe lavar la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

* Comenzar el protocolo en el envase original, etiquetado y cerrado.

* Almacener el producto bajo techo, en un lugar seco, seco y ventilado.

* No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni frutas.

* Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

* Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonomill glicina

* En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, moviendo la etiqueta.

* En caso de ingestión si el paciente está consciente y alerta, inducir el vomito.

* No administrar leche, aceite o sustancias grasas.

* En caso de contacto con los ojos, instalar los ojos abiertos y el agua lluvia durante 15 a 20 minutos.

* Remover los lentes de contacto si los hubiere y seguir enjuagamientos.

* En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.

* En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladar a una zona bien ventilada. Si la persona no responde, llamar a los servicios de emergencia.

* Nota al medico: no tiene sentido el específico seguir tratamiento sintomático

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CAMPO - SATO 757 SG: 0800-1-300-010200

Es Salud en linea (número gratuito): 0800-1-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DERECHOS

Y ENMAZOS VACIOS

* Despues de usar el contenido, destruir el envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para ese fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

* Peligros para organismos acuáticos: pláticas acuáticas y semi acuáticas.

* No contaminar lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.

* No contaminar los suministros de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

* Respetar una brecha de no aplicación hacia corrientes de agua de 8m (mínimo 5 metros).

* Peligros para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir arrastres en la zona tratada.

* El usuario debe aplicar todas las medidas necesarias para controlar la difusión.

* En caso de derrame vedar el producto y dejarlo seco en los sitios designados por las autoridades locales para ese fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Usos:

CULTIVO	Plagas	Dosis l/Ha	PC (g/l)	LMR (ppm)	
ESPARAGO	Grana china Cocullo Grana dulce Cebolla Yujo Verdejita Moco de pavo Amar. seco Capulli Rizo de zorro Pulpa de gallina	Sorghum halepense Cyperus rotundus Cynodon dactylon Cynodon schizanthus Portulaca oleracea Echinochloa colonaum Brachys pilosa Nicandra physalodes Solanum verneuilii Eruca sativa	2	5	0.1

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenza

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPO - SATO 757 SG es un herbicida post-emergente no selectivo.

Para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes. Actúa de forma sistémica y se move a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se traspasa hasta el sistema radicular. Los efectos varían en 2-4 horas dependiendo de las malezas tratadas. Durante 2-4 días después de la aplicación y en malezas perennes no más de 7-10 días o más. No persistencia en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, revolver bien y compear el volumen de aplicación.

FRECUENCIA Y ÚNICO DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 757 SG debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estadio de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en alto crecimiento. Aplicar totalmente. Realizar una aplicación por campo como máximo (2 campos al año).

PERÍODO DE REINGRESO:

Reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Compatibilizar con otras herbicidas en mezclas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

FITOTOXICIDAD:

El **TUJU** del Rejero garantiza que es característica de la fórmula química del producto consumido en este envase, corresponde a las anotadas en el contrato con las partes涉猎 de los cultivos. Esforzar siempre las etiquetas y que es eficaz para los frutos aquí recomendados si se usa y aplica consolida sus anotaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El **TUJU** del Rejero garantiza que es característica de la fórmula química del producto consumido en este envase, corresponde a las anotadas en el contrato con las partes涉猎 de los cultivos. Esforzar siempre las etiquetas y que es eficaz para los frutos aquí recomendados si se usa y

CAMPO - SATO 757 SG

PLAGUICIDA QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULO SOLUBLE - (SG)

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
 N.º 8 Lengjing Street,
 Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
 Teléfono: + 86 - 574 - 87301088 /
 Fax: + 86 - 574 - 87288208

Formulado por:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
 Av. Los Miros 239, Lince, Lima 14, Perú.
 Teléfonos: 00 51-1 - 222-2795



宁波力克化工有限公司
 NINGBO GENERIC CHEMICAL LTD.

Contenido Neto: **60 Kg**

Lote N°:
 F. de Form.
 F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO