

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito.
- No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar con abundante agua fría por 15 a 20 minutos.
- Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

Salud en línea (línea gratuita): 0801 - 10200
opción 4

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CAMPO - SATO 757 SG es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes. Actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

CAMPO - SATO 757 SG debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliamente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

Reingresar al campo después de 24 horas.

Compatible con otros herbicidas pre emergentes

CAMPO - SATO 757 SG es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

USO :

CULTIVO	Plagas		Dosis Kg/200 L	Dosis Kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico				
ESPARRAGO	Gramma china	<i>Sorghum halapense</i>	-	2	5	0.1
	Coguito	<i>Cyperus rotundus</i>				
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Cadillo	<i>Cyperus echinatus</i>				
	Huyo	<i>Amaranthus dubius</i>				
	Verdelaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Moco de pavo	<i>Echinochloa colonum</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Capulí	<i>Nesandra physaloides</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>				
Pata de gallina	<i>Elaeusine indica</i>					
CAÑA DE AZÚCAR	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	-	1.1 – 2.2	21	0.1
	Coguito	<i>Cyperus rotundus</i>				
	Gramma china	<i>Sorghum halapense</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
MANGO	Gramma china	<i>Sorghum halapense</i>	1	1.25	14	0.2
	Pata de gallina	<i>Elaeusine indica</i>				
	Verdelaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

LMR: Límite Máximo de Residuos

PG:Periodo de Carencia



PLAGUICIDA QUIMICOS DE USO AGRICOLA

GRANULO SOLUBLE - (SG)

Glyphosate	757 g/Kg
Aditivos	csp 1 Kg

Registro PQUA N° 1455 - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfono: + 51 -1 - 222 - 2795



Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

Importado y Distribuido por:
MEXAGRO DEL PERU S.A.C.
 Av. Las Camelias Nro. 877 int. 302 Urb.
 Santa Cruz - San Isidro - Lima - Peru
 Email: Mexagro.delperu@mail.com



Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: 60 KG

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**