

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# CAMPO -- SATO

## 757 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
HERBICIDA AGRÍCOLA  
GRANULOS SOLUBLES (SG)

### Composición:

Glyphosate ..... 757 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1455 - SENASA

### Titular de Registro:

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C.  
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: +51-1-222-2795



### Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

### Importador y Distribuidor :

ALIMENTA PERU S.A.C.  
Av. Bolognesi N° 466, Chiclayo-Lambayeque-Perú.  
Teléfono: 074-607520



### N° de Lote:

### Fecha de Formulación:

### Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 60 KG

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fosfonometil glicina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos.
- Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antidoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106  
NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C.: + 51-1-222-2795

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**CAMPO - SATO 757 SG** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes. Actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se traslada hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

### Consulte con un ingeniero agrónomo

| Cultivo        | Plaga                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dosis Kg/200 L | Dosis Kg/Ha | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
|                | Nombre Común                                                                                                                                     | Nombre Científico                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |           |           |
| ESPARRAGO      | Grana china<br>Coquito<br>Grana dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | <i>Sorghum halepense</i><br><i>Cyperus rotundus</i><br><i>Cynodon dactylon</i><br><i>Cenchrus echinatus</i><br><i>Amaranthus dubius</i><br><i>Portulaca oleracea</i><br><i>Echinochloa colonum</i><br><i>Bidens pilosa</i><br><i>Nicandra physaloides</i><br><i>Setaria verticillata</i><br><i>Eleusine indica</i> | -              | 2           | 5         | 0.1       |
| CAÑA DE AZÚCAR | Amor seco<br>Coquito<br>Grana china                                                                                                              | <i>Bidens pilosa</i><br><i>Cyperus rotundus</i><br><i>Sorghum halepense</i>                                                                                                                                                                                                                                        | -              | 1.1-2.2     | 21        | 0.1       |
| MANGO          | Amor seco<br>Grana china<br>Pata de gallina<br>Verdolaga                                                                                         | <i>Bidens pilosa</i><br><i>Sorghum halepense</i><br><i>Eleusine indica</i><br><i>Portulaca oleracea</i>                                                                                                                                                                                                            | 1              | 1.25        | 14        | 0.2       |

PC: Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**CAMPO - SATO 757 SG** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

### PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar al campo después de 24 horas.

### COMPATIBILIDAD

Compatible con otros herbicidas pre emergentes.

### FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

