

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Moderadamente peligroso por inhalación.
 - Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
 - Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
 - Levemente irritante a los ojos, usar gafas protectoras.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - No reemvasar o depositar el contenido en otros envases.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, ni bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neotololnolide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón, durante 15 minutos. Consultar al médico especialista.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No al médico: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ SAC: 452-4512

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multícolo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.

GALACTUS 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Incidatoprid 350 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1456 - SENASA

Titular del Registro: BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.

Importado y distribuido por:

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.



BIOQUÍMICA
AGRICOLA DEL PERU C

Av. Mantco Cápac N° 847 Carmen de la Legua - Reynoso - Callao
Teléfono: 452-4512



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GALACTUS 350 SC es un insecticida sistémico y translinar que actúa por contacto e ingestión.

GALACTUS 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de plagas indicadas en el cuadro de usos.

GALACTUS 350 SC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/200 L	L/Ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Profliposita longifolia	0.2	0.5	7	0.05
Perenio	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.2	0.5	7	0.5
Papa	Caracha (Mosquilla de los brotes)	Profliposita longifolia	0.2	0.6	14	0.5
Mandarina	Queresa coma	Lepidosaphes bectei	0.14	0.7	30	1.0
Vid	Flojera	Viteus vitifolae	0.1-0.15	-	30	1.0
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Togodona (Sogatodes) orizivorus	0.2	0.2	30	1.5

P.C. Período de carencia (días) L.M.R. Límite máximo de residuos (ppm, partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento con GALACTUS 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo (tratado) antes de las 24 horas.

COMPATIBILIDAD: GALACTUS 350 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

FITOTOXICIDAD: GALACTUS 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados. Se sugieren las instrucciones señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

