

29.2 cm

26/01/2016

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol**
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial. Llamar a un médico.
 - En caso de contacto cutáneo: lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar y eliminar toda la ropa y zapatos contaminados.
 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando los ojos, consulte a un médico.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar a un médico o un centro de información toxicológica.
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
 - Antídoto: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 106
CAISAC (01) 253-6444

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los residuos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con runas, reáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame del producto, debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su migración hacia aguas subterráneas.

KLINER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1459 - SENASA

Titular de Registro, Importación
y Distribuido por:

Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavente 99, Oficina 1, Edificio del Bank II Miraflores - Lima - Perú
Telf: (01) 253-6444 / info@grupoandina.com.pe

Formulado por:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd.

6th Floor, Gaixinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750, Jinan, Shandong

Telf.: + 86-531-88875230, 88875231, 88875227

Fax: +86 – 531 – 88875232, 88875224

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 20 L
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

KLINER® esta compuesto por difenoconazole y azoxystrobin tiene modo de acción sistémico y de contacto.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido a un cilindro o botella de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

“CONSULTE CON UN ASESOR AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	L/200 L			
VINO	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	-	7	2*	0.1**
ARROZ	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.5	-	30	5*	3**
PAPAYA	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.15 - 0.20	3	3*	0.8**
CEBOLLA	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.25	7	10*	0.5**
ESPARRAGO	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.15-0.20	93	0.1*	0.03**
CAFÉ	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	0.25	30	0.03*	0.05**
PALTO	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>	0.9	0.15	21	2*	0.6**

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de carencia. * Azoxystrobin **Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **KLINER** (i.e. Azoxystrobin y Difeconazole) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

En zonas endémicas de la enfermedad, aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada hasta después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



14.5 cm