

16 cm.

FRUTIZOL 25 % SC

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Paclobutrazol.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Registro RCP N° 1054 – SENASA

Titular del registro:

FITOCORP SAC

Jr. Las Poncianas N° 147. Interior 2 B. La Molina vieja. La Molina – Lima

Teléfono: 016522183

Formulado por:

BETA CHEMICALS

Rm. 707, Blk. A, Kingsound Center, N° 116 Zizhuyuan road, Beijing 100097, China

Importado y distribuido por:



Contenido Neto: 5 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente peligroso si es inhalado.
- Ligeramente peligroso si es ingerido.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas luego de aplicado el producto.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente con llave sombreado, seco y ventilado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de inhalación. Mover a la persona a un area ventilada, dé respiración artificial de ser necesario. Si es necesario llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. Consultar al médico en caso de irritación.
- En caso de ingestión accidental llame al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o por un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Tlf.:0800-1-3040 (Atención 24 horas)

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4

FITOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de **FRUTIZOL 25 % SC**, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

FRUTIZOL 25% SC, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	USO	DOSIS	P.C (días)	L.M.R (ppm)
		L/Ha		
Palto	Durante la floración y etapa de crecimiento de la fruta.	4	120	0.5

P.C Periodo de carencia

L.M.R Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **FRUTIZOL 25 % SC** como máximo 2 aplicaciones por campaña, siendo una campaña por año y respetando un intervalo de 15 días entre aplicación, durante la etapa de floración y crecimiento de la fruta.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

