

Medida bolsa trilaminada: 23 cm x 16 cm
AGOSTO 2016
ML

TIRA

PANTONE 293 C

PANTONE 7466 C

PANTONE 300 C

Crisuron

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición:

Halosulfuron methyl750 g/kg
Aditivos..... csp... 1kg

Reg. PQUA N° 1466 - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401, La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 419-3000
E-mail: info@corpmontana.com

Formulado por:

WILLOWOOD LIMITED

17/f, Seaview Plaza, N°283
Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan.
Hong Kong

Contenido Neto: 100 g

Lote N°:

Fecha de Form.

Fecha de Exp.:

 **MONTANA**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Medida bolsa trilaminada: 23 cm x 16 cm
AGOSTO 2016
ML

RETIRA

PANTONE 293 C

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, NO INGERIR.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Sulfonilurea
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso del contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto. Se requiere atención médica inmediata.
- En caso del contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene aplique respiración artificial. Mantener al paciente caliente y llevarlo al médico.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
MONTANA: 419-3000
ESSALUD: 117 ó 0801-10200
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328-7398

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **CRISURON** es un herbicida sistémico post-emergente recomendado para el control de algunas malezas de hojas anchas y ciperáceas. También presenta efecto pre-emergente.
- **CRISURON** es absorbido por hojas, brotes y raíces de las malezas translocándose hacia los órganos vegetativos subterráneos (rizomas y tubérculos) causando el cese del crecimiento de la maleza y posterior muerte. El control completo ocurre dentro de 7 a 14 días.
- **CRISURON** se debe aplicar cuando la maleza se encuentre en activo crecimiento, sin estrés de ningún tipo.
- Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, realizar una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua en un balde aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) o equipos accionados por el tractor que se encuentren debidamente calibrados asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/ha)	PC (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	“Coquito” “Yuyo”	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Amaranthus hybridus</i>	0.050 – 0.1	1	0.8
Arroz	“Coquito” “Yuyo” “Verdolaga”	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Portulaca oleracea</i>	0.04-0.06	48	0.05

PC: Periodo de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) / N.A.: No aplica

