

22.80

SENASA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambiente fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Cyclohexanedione oxima**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Si es ingerido: no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. NO INDUCIRAL VOMITO.
- Si es inhalado, mueva a la persona al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: Tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SHARDA PERU SAC: 222-2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre: no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

GRAMACIL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Clethodim 125 g/L
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 1468 - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU SAC
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Formulado por:
Yifan Biotechnology Group Co., Ltd.
No. 136 Zhongxing Road,
Wenzhou Industrial Zone,
Zhejiang, China

Importado y distribuido por:
**SOCIEDAD ANÓNIMA
FAUSTO PIAGGIO**
Av. Guillermo Dansey 2045
Cercado de Lima, Perú.
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail:ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471



Contenido Neto: 500ml

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GRAMACIL es un herbicida sistémico selectivo post emergente. Es recomendado para el control de las malezas indicadas en el cuadro de usos. Se absorbe y se traslada fácilmente desde el follaje a las raíces y partes en crecimiento de la planta. Es un inhibidor de la síntesis de lípidos, evita la formación de ácidos grasos, los cuales son esenciales para la integridad de las membranas celulares, afectando así el crecimiento de las plantas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se debe disolver previamente GRAMACIL, en un recipiente con agua, mezclando homogéneamente, luego agregar al cilindro o mochila (según sea el caso) y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Cebolla	Pata de gallina	<i>Elysiene indica</i>	0.5	0.75	45	0.5
Espárrago	Grana dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	0.75	—	1	1.7

L.M.R.: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones se deben realizar cuando las malezas hayan alcanzado 10 cm de alto. Para los cultivos de cebolla y espárrago realizar como máximo 1 aplicación por hectárea /campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las zonas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

GRAMACIL es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

GRAMACIL no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

12 cm



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO