

JAVELIN WG

Bacillus thuringiensis Var. KURSTAKI

GRANULO DISPERSABLE – WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Bacillus thuringiensis variedad Kurstaki* 850 g/kg
Aditivos..... c.s.p..... 1 kg

*Equivalente a 64 gramos de toxina delta serotipo 3^a-3B-Cepa SAI

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

JAVELIN WG es un insecticida biológico que debe ser usado de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la etiqueta

- Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto.
- No coma, beba o fume durante su aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación ya que el producto es irritante para los ojos y la piel.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar ni depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evitar exponer el producto directamente al sol.
- Su almacenamiento debe hacerse en lugares techados, frescos y bien ventilados.
- Manténgase alejado del calor, en su envase original bien cerrado y etiquetado.
- Los envases desocupados se deberán destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser aprobada por la respectiva autoridad local.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión y el paciente se encuentre consciente, dar de beber grandes cantidades de agua para inducir al vomito. Si la persona se encuentra inconsciente, no administrar nada de beber y conducir inmediatamente al paciente al médico más cercano.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón incluyendo el cabello y debajo de las uñas. Remover la ropa contaminada y lavarla antes de usarla nuevamente. No aplicar ninguna medicina a menos que sea recomendada por el médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. No aplicar ninguna medicina a menos que sea indicado por el médico

NOTA AL MÉDICO

- No tiene antídoto específico. Tratar sintóticamente.
DL₅₀ oral aguda: > 5000 mg/kg
DL₅₀ Dermal aguda: > 5000 mg/kg

Teléfonos de emergencia: **Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A. (01) 630-6400.**

NOTA AL COMPRADOR

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

INDICATIVOS DE USO: JAVELIN WG es un insecticida biológico específico y selectivo a base de esporas y cristales proteicos de *Bacillus thuringiensis* variedad Kurstaki, apropiado para el control de larvas de lepidópteros como *Spodoptera*, *Heliothis*, *Copitarsia* y otras especies, recomendándose realizar aplicaciones en los primeros estadios larvales. JAVELIN WG es un bio insecticida que actúa por ingestión, produciendo destrucción del sistema estomacal de las larvas lentamente. JAVELIN WG debe ser aplicado de manera preventiva cuando se hayan detectado huevos y larvas de primer y segundo estadio, realizando una buena cobertura en la fumigación de tal modo que todo el follaje quede tratado con el producto.

SITEMA DE PREPARACION Y APLICACIÓN: Asperjar directamente sobre la plaga y humedecer bien el follaje para incrementar su efectividad. Aplicar temprano por la mañana o por la tarde en etapas de baja insolación.

Para una mejor preparación del caldo, en un recipiente realizar la mezcla de JAVELIN WG con una pequeña cantidad de agua, una vez disuelto bien el producto, agregar esta solución al cilindro de preparación y agregar un adherente y dispersantes para una mejor acción. Usar el caldo el mismo día de su preparación, no más de 12 horas después de su preparación.

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plaga		Dosis		L.M.R	P.C
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	g/cil		
Esparrago	Gusano comedor de follaje	<i>Copitarsia inconnoda</i>	1,0	-	0	0
		<i>Spodoptera eridanea</i>	1,0-1,5	-		
<i>Capsicum annum</i>	Perforador de fruto	<i>Heliothis virescens</i>	1,0	-		
		<i>Spodoptera eridanea</i>	0,8- 1,2	-		
Alcachofa	Perforador de capítulos	<i>Heliothis virescens</i>	1,0	-		
		<i>Spodoptera eridanea</i>	1,0-1,5	-		
Tomate	Perforador de fruto	<i>Heliothis virescens</i>	0,5	-		
Arándano	Perforador de fruto	<i>Heliothis virescens</i>	-	500		
Arveja	Perforador de fruto	<i>Heliothis virescens</i>	1,0 – 1,5	-		
Quinua	Gusano comedor de follaje	<i>Spodoptera eridanea</i>	-	500		

P.C: período de carencia (días). L.M.R: límite máximo de residuos (ppm).

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIONES: Aplicar de acuerdo a las evaluaciones de campo y las recomendaciones del asesor técnico.

PERIODO DE REINGRESO: ingresar al campo 6 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: JAVELIN WG es compatible con numerosos acaricidas, fungicidas, dispersantes, adherentes, humectantes, etc., a excepción de materias excesivamente alcalinas de pH mayor a 10,5 recomendándose aplicar de inmediato cuando se trate de mezclas.

FITOTOXICIDAD: A las dosis recomendadas no causa fitotoxicidad.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Reg. PBUA N° 089-SENASA

Titular del Registro:

FARMEX S.A. Calle Dean Valdivia 148,
Piso 7, San Isidro, Lima- Perú

Formulado por:

CERTIS: Certis USA, LLC.9145 Guilford Road,Suite 175
Columbia, Maryland. EE.UU.

Nº de lote:

Fecha de fab:

Fecha de venc:

Contenido neto: 1 Kilo



Importado y distribuido por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.
Telf.: (01) 630 6400

"MATENGASE ALEJADO DE PERSONAS,
ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
MEDICINALES"

**LIGERAMENTE PELIGROSO
PRECAUCION**

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUES DE USAR EL PRODUCTO"

