

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **3 TAC BIOFUNGICIDA WP** no ofrece riesgo frente a una ingesta casual, en caso de que ello sucediera provocar el vómito y realizar un enjuague bucal con abundante agua. Si continúan las molestias consulte con un médico.

Teléfonos de emergencia:

Central de urgencias y emergencias de EsSalud: 117 (línea gratuita). CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita). FARMEX: (01) 630-6400

NOTA AL MEDICO

DL₅₀ Oral aguda : > 500 mg / Kg
DL₅₀ Dermal Aguda : > 2000 mg / Kg

ANTÍDOTO

No hay antídoto específico

NOTA AL COMPRADOR. El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

3 TAC

Trichoderma harzianum, T. viride y T. longibratum

POLVO MOJABLE - WP

Composición Química:

Ingrediente activo	%
<i>Trichoderma harzianum, T. viride y T. longibratum</i>	30,0
Aditivos	c.s.p.....100,0

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 146 - SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia N° 148, piso 7
San Isidro, Lima- Perú

Formulado por:

Avance Biotechnologies Chile S.A.
Calle Nueva 5367
Conchali, Santiago de Chile



Importado y distribuido por:
FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7,
San Isidro, Lima-Perú.
Teléfono: 630-6400.

N° de Lote:
Fecha de Fab.:
Fecha de Venc.:
CONTENIDO NETO: 1 Kilo

INDICATIVOS DE USO

3 TAC BIOFUNGICIDA WP es un fungicida biológico a base de tres especies de hongos del género *Trichoderma* el cual está activado en forma de esporas contenidas en una matriz húmeda biodegradable, su acción se debe a una rápida colonización del lugar desplazando a los hongos patógenos al privarlos de nutrientes y espacio.

SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACIÓN

Vaciar la cantidad de **3 TAC BIOFUNGICIDA WP** a utilizar en un recipiente (de aprox 20 litros) Adicionar agua sin llenar el recipiente. Revolver mezclando bien el **3 TAC BIOFUNGICIDA WP** con el agua, una vez disuelto deje descansar 3 minutos y luego colar. Una vez que se ha colado la mezcla (para evitar el tapado de boquillas) incorporar al tanque del equipo de aplicación y de ser necesario completar el volumen solo con agua.

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		DOSIS		Periodo de carencia	LMR
	Nombre común	Nombre científico	g/cil	kg/ha		
ALCACHOFA	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	350	-	0	-
ESPÁRRAGO	Stemphiliium	<i>Stemphylium versicarium</i>	350	-	0	-
ESPÁRRAGO	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	350	-	0	-
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1000	-	0	-
PIMIENTO	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	350	-	0	-
PIMIENTO	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	350	-	0	-
PIMIENTO	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	350	-	0	-
TOMATE	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	350	-	0	-
VID	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,5 a 2,0	0	-

L.M.R.=Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

3 TAC BIOFUNGICIDA WP no tiene restricciones entre aplicación, cosecha uso o consumo. Puede ser aplicado en áreas abiertas en invernaderos sin restricciones

COMPATIBILIDAD.

3 TAC BIOFUNGICIDA WP no debe aplicarse conjuntamente con pesticidas químicos



**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

