"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
• Este producto es tóxico por ingestión.
• Evitar respirar polvos ó inhalar, es ligeramente peligroso.
•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
•No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
• Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
• Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
•Después de la mezcla y aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS
• Grupo químico: Triazinas
• En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente, no inducir al vómito.
• En caso de contacto con los ojos: levantar los parpados y lavar los ojos con abundante agua y jabón.
•En caso de contacto con la piel; retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
•En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre, brindar respiración artificial si fuera necesario, llamar al médico.
• No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-1-3040 **CROP BUSINESS SAC: 349-2669**
ESSALUD:080-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
•Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
• Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar lagos, ríos, estanques o acequías con los desechos y envases vacíos.
•Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre.
•No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
•En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
•El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
- **CYBOR 75 WP** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Dentro de la planta tiene acción sistémica y translaminar.
- **CYBOR 75 WP** inhibe la síntesis de quitina interfiriendo en los procesos de muda y empupamiento del insecto (metamorfosis).
- **CYBOR 75 WP** es eficaz en el control de larvas de dípteros minadores de hoja que atacan diversos cultivos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
• Iniciar la aplicación de **CYBOR 75 WP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.
• Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.
• Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
CYBOR 75 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

FITOTOXICIDAD
El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomiendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONÓMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (dias)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg /200 L	kg /Ha		
PAPA	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	0.1	0.3	35	1.0
TOMATE	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	0.1	0.3	14	1.0

P.C.: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

CYBOR 75 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICION QUÍMICA:

Ciromazina _____ 750 g/kg
Aditivos _____ c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 1476-SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:
BIOAGROCORP TRADING SAC

Av. Melgarejo Nº 580 Dpto. 402 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 370-7251

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido neto: 1 Kg
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23 Lane, Shenzhuan Road
Songjiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO