

COD.

- Este producto es DANINO. NO Ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **EMERGENCIAS:** **CICOTOX** Teléfono: **0800-13040**
ESSALUD Teléfono: **423-7600**

Nota al médico: Tratamiento sintomático. No hay ANTÍDOTO específico.

- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Remueva inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con agua y jabón por 15 minutos.
- En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala en reposo.

"Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos perforándolos y deposítelos en el lugar designado por las autoridades locales para este fin".

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



- ALTAMENTE peligroso para abejas. No aplicar si se verifica su presencia.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

• Dimetoato.....	376 g/L
• Solvente Naphta	394 g/L
• Aditivos.....	c.s.p. 1 L

TITULAR DE REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
6th Floor Geoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750#
Jinan Shandong China



CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



NO CORROSIVO

INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



® Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO
PAÑINO



DABAC, debe ser usado únicamente para el control de insectos plagas en los cultivos agrícolas indicados en el cuadro de usos y dosis, puede ser empleado en pulverizaciones al follaje con bomba de mochila manual o a motor y en aplicaciones aéreas tratando de lograr una cobertura uniforme.

DABAC, debe ser aplicado en momentos oportunos para evitar daños extremos de las plagas en los cultivos.

DABAC, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/20 L	ml/200 L		
Ajo	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	30 - 40	300-400	14	0.05
Páprika	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	30 - 40	300-400	1	0.02
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	35 - 40	350-400	14	0.02

PC: Periodo de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos en ppm

Las aplicaciones pueden repetirse cada 7 días en caso de reinfestación y en todas las etapas fenológicas del cultivo, hasta 14 días antes de la cosecha.

No ingrese a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

DABAC, es compatible con la gran mayoría de los insecticidas y pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".