

23 cm

19 cm

8.5 cm

19 cm

8.5 cm

KYLATE
50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

Composición:

Eamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg PQUA N° 1096 - SENASA
Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Formulado por:
N°de Lote: NORCHEM JIANGSU CORPORATION
Contenido Neto: 1 Kg West Tower, Fortune International Building
Fecha de Vencimiento: N° 359 Hongwu Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
 - Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
 - No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Avermectinas
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
 - En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
- CICOTOX: 08001-3040 BIOAGROCORP TRADING SAC: 370-7251
ESSALUD: 117 (Gratis) CIPROSQUIM: 0800-5-0847
- El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
 - No aplicar en época de floración del cultivo.
 - No aplicar en presencia de polinizadores.
 - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
 - Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
 - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
 - Tóxico para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estancos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	Heliothis virescens	0.2	7	0.02
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	0.15	3	0.02
Maíz	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15	7	0.01

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

