

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NORDOX 75 WG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables (WG)

Composición:

Oxido cuproso..... 860 g/kg*

Aditivos c.s.p. 1kg

*(Equivalente a 750 g/kg de ión cobre libre).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- "Cuidado no ingerir.
- "Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
- "Causa irritación moderada a los ojos.
- "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- "No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas ni forrajes.
- "Conservar el producto en el envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- "Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- "Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- "Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y seco y ventilado.

"PRIMEROS AUXILIOS:

- "Grupo químico: inorgánicos.
- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- "En caso de ingestión: no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral, si la persona no está consciente.
- "En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario, brindar respiración artificial.
- "En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 a 15 minutos..
- "En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar los ojos con abundante agua durante a 15 a 20 minutos.

ANTIDOTO: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106 - Titular de registro: 363-8659 - ESSALUD:0800 - 10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya el envase triturandolo o perforandolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes "evitar la deriva por el viento".
- Toxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua d al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NORDOX 75 WG es un fungicida que contiene el 75% de cobre metal en forma de óxido cuproso, formulado en gránulos dispersables (WG) muy finos y huecos que aumentan la mojabilidad, suspensión, adherencia y la persistencia, permitiendo una distribución más uniforme del producto formulado en las superficies tratadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Científico	g/cil	Kg/Ha		
Espárrago	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400		3	5
Mandarina	Mancha perda	<i>Cephaleuros virescens</i>	400		15	20
Naranja						
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>		1	N.A.	N.A.
Palto	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	400		0	20
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	600	1.95	N.A.	5.0

P.C.= Periodo de carencia en días; ppm= Partes por millón

L.M.R.= Limite máximo de residuos en ppm N.A. = No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda 2 aplicaciones/ campaña/ año. El intervalo de aplicación es de 10 a 14 días. Se recomienda 1 aplicación/ campaña/ año en el cultivo de arándano. Con un gasto de agua de 650L/ha . Debe realizarse la aplicación en brotación o antes de la floración en el cultivo de arándano.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: NORDOX 75 WG es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD: NORDOX 75 WG no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Titular del Registro:

Agrilab
Perú

AGRILAB PERU SRL
Jiron Saenz Peña 344 Oficina 105 Magdalena del Mar
Lima17 - Perú

Formulador :
NORDOX Industrier AS
Østensjøveien 13- N-0661. Oslo Noruega.

PQUA N° 1479 - SENASA
Importado y distribuido por:

hortus

Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041 / Fax:718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto: 1Kg

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

