

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Triazol + Estrobirulina**
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX : 0800-1-3040 BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ SAC : 452-4512  
CISPROQUIM: 0800-5-0847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO  | PLAGA           |                               | DOSIS      |            |              | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm)  |
|----------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|---------------|
|          | Nombre Común    | Nombre Científico             | kg/200 L   | kg /ha     | %            |                |               |
| Cebolla  | Punta seca      | <i>Stemphylium vesicarium</i> | -          | 0.3 - 0.5  | -            | 14             | 0.02          |
| Vid      | Oidium          | <i>Erysiphe necator</i>       | -          | 0.3        | 0.03         | 21             | 2.0*          |
|          | Moho gris       | <i>Botrytis cinerea</i>       | -          | 0.3 - 0.35 | 0.03 - 0.035 |                | 5.0**         |
| Arroz    | Pyricularia     | <i>Pyricularia oryzae</i>     | -          | 0.2 - 0.25 | -            | 35             | 0.02          |
| Café     | Roya del cafeto | <i>Hemileia vastatrix</i>     | 0.2        | -          | -            | 30             | 0.1*          |
|          | Ojo de gallo    | <i>Mycena citricolor</i>      | 0.15 - 0.2 | -          | -            |                | 0.05**        |
| Pimiento | Oidium          | <i>Leveillula taurica</i>     | 0.125      | 0.25       | -            | 7              | 0.5*<br>0.3** |

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carencia

\*Tebuconazole

\*\*Trifloxystrobin

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- **PETHRUS 75 WG**, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.

- **PETHRUS 75 WG**, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación de la plaga.

En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo.

En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de inflorescencias afectadas.

En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la época de macollamiento y formación de panícula.

En Café: para el control de Ojo de gallo, usar la menor dosis a inicios de la enfermedad. El gasto de agua es de 200 Lt/Ha.

- Número máximo de aplicaciones

En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.

En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.

En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días; considerando 2 campañas al año.

- No aplicar **PETHRUS 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**PETHRUS 75 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidante.

**FITOTOXICIDAD**

El producto **PETHRUS 75 WG** no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# PETHRUS

## 75 WG

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

#### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### GRÁNULO DISPERSABLE - WG

**COMPOSICIÓN:**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tebuconazole    | 500 g/kg    |
| Trifloxystrobin | 250 g/kg    |
| Aditivos        | c.s.p. 1 Kg |

**Reg. PQUA N°**

Titular del Registro: **BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.**

Importado y Distribuido por:

**BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.**



Av. Manco Cápac N° 847 Carmen de la Legua

Reynoso - Callao

Teléfono: 452-4512

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido Neto: 1 Kg.**

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

JIANGSU HEYE AGROCHEMICAL CO. LTD.

Linhai Industrial Park Area, Sheyang County,

Yancheng, Jiangsu Province

CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

