

15 cm

9 cm



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRICOLA
POLVO SOLUBLE (SP)

Composición Química:
Methomyl900 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

PQUA N° - SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

TITULAR DEL REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES SAC



Av. El Polo N°670 Of C-402. Lima.
Teléfono: 713-9960

FORMULADO POR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW
CHEMICAL CO. LTD.
Binhai Economic Development
Area,Weifang, Shandong 262737
China

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N°670 Of C-402. Lima.
Teléfono: 713-9960

Contenido Neto: 200 g
Lote N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
“MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, destruya el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PESOVER es un insecticida de mecanismo neurotóxico. Los efectos tóxicos son bastante rápidos, lo que lleva a la parálisis y la muerte de las plagas. El sistema nervioso se ve interrumpido en la sinapsis entre los axones, se inhibe la enzima acetilcolinerasa, como resultado de este bloqueo de señales nerviosas se produce parálisis y posteriormente la muerte. Controla una gran gama de insectos plagas a través de ingestión o por contacto

Preparación y aplicación:
Para obtener un buen control es necesario asegurar un buen cubrimiento de la planta a tratar.
Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
Pimiento	Nombre común	Nombre científico	0.20-0.30	7	0.02
	Gusano perforador de la bellota	Heliothis virescens			

P.C. = Periodo de carencia LMR = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar al observar las primeras infestaciones de los insectos plagas, siendo importante lograr una buena cobertura con el producto. Número máximo de aplicaciones : 2 por campaña teniendo en cuenta que el pimiento es de campaña anual.

PERIODO DE REINGRESO
Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 48 horas.

