

RANGO® 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Glyphosate 750 g/kg

Aditivosc.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

**Formulado y
envasado por:**



**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**
Town South Donghua District, Longyou
County Zhejiang, China
Tel: +86-(0)570-7855158

**Titular del Registro,
Importador y Distribuidor:**



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041 / Fax:718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto : 25 kg

Lote N° :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

v20160226

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- CUIDADO, NO INGERIR.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Evite el contacto, probablemente CANCERÍGENO.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realizar las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Derivado de Glicina.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: Retirar y desechar la ropa contaminada. Lavar completamente la piel con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar gratis a:

**CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 0801-10200**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

- No contaminar ríos, lagos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RANGO 75 WG es un herbicida sistémico no selectivo, obteniéndose los mejores resultados cuando las malezas están en activo crecimiento. **RANGO 75 WG** no tiene efecto residual en el suelo por lo que puede ser utilizado en el control de malezas en siembras de cero labranzas. Se aplica directamente a la maleza evitando el contacto con los tallos verdes, follaje, frutos de los cultivos. El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de pulverizado. Su fórmula contiene surfactante por lo que no es necesario añadirle ningún tenso activo, solo se recomienda en el caso que el producto se aplique con aguas duras o salobres. La concentración del producto en agua no debe ser menor al 1%. Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar el producto en el estado post-emergencia de la maleza, usualmente basta con una aplicación excepto en aquellos casos de malezas que hayan estado germinando por un periodo prolongado. Aplicar en cualquier época del año.

PERIODO DE REINGRESO: Después de 24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: RANGO 75 WG no es compatible con productos que contengan metales bivalentes de reacción alcalina o arcillas y que contienen cloro.

FITOTOXICIDAD: A la dosis y usos recomendados no presenta fitotoxicidad, sin embargo, al ser un herbicida no evitarse el contacto con las plantas que no deseen eliminar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (kg/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINA	“Cadillo”	<i>Cenchrus echinatus</i>	1	1 - 2	0.5
	“Chamico”	<i>Datura stramonium</i>			
	“Pata de Gallina”	<i>Eleusine indica</i>			

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límites máximos de Residuos en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas el producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

