64.5 CMS

15 CMS

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni dar agua a la persona si está inconsciente, lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Llevar al médico oftalmólogo.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario. Consultar al médico.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a**:
  CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf.: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
"Peligroso para organismos acuáticos".
"No contamine ríos, estanques con los desechos o envases vacíos".
"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
"Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.
"El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva del producto".
"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
" En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas"

KAMPERO®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN
Uniconazole-p..... 50 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQUA Nº .... - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar - Perú
Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
EFAL AGRI
8, Hamelacha St., P.O.B. 8213
Netanya 42293, Israel

ENVASADO POR:
DROKASA PERÚ S.A.
Av. Marcos Farfán Nº 3459. Urb. Industrial Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

DROKASA PERU

CONTENIDO NETO: 20 Litros

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
KAMPERO, es un inhibidor sistémico de síntesis de giberelinas. Controla el desarrollo de la planta, la tasa de producción de biomasa y el tamaño de frutos.
KAMPERO actúa sistemáticamente a nivel de células de las plantas para controlar la síntesis de hormonas.

KAMPERO es usado para incrementar el rendimiento y tamaño de los frutos y para mejorar la forma de los frutos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		%	L/ha		
Palto (*Persea americana*)	Aplicar en época de floración, cuando se tenga como máximo el 50% de cuaja de frutos. Aplicar en pulverización de gotas finas en forma de lluvia o rocío al área foliar, evitando el chorreo.	0.5 - 0.6	5 - 6	N.A.	0.01

PC: Período de carencia
NR: No registra
LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar una aplicación por campaña por año. Las aplicaciones deben ser bien dirigidas al cultivo a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

PERÍODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
KAMPERO es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".