

21.1 cm

7.5 cm



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**GRÁNULOS SOLUBLES SG**

**Composición:**  
Emamectin benzoato ..... 50 g/Kg  
**Aditivos:**..... C.S.p 1 Kg

**Registro PQUA N° 971 - SENASA**

Titular del registro:  
**AVGUST PERU SAC**  
Caf. Los Tejedores No.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.  
Formulado por:  
Beta Chemicals Ltd.  
Rm.707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zichuan Road, Beijing 100097, China

Importador y Distribuidor:  
**avgust** crop protection

Contenido Neto: 1000 gr.  
N° Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Registro:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto bájese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo químico: Avermectina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.  
En caso de emergencia llamar a:  
**CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**  
**ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4**  
**AVGUST PERU SAC: 016522182**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**  
Después de usar el contenido inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y arácnidos beneficios.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de **EMACTIN 5% SG**, a utilizar agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.  
**EMACTIN 5% SG**, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.  
Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivos	Plaga		Dosis		PC (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Pimiento	Gusano Perforador Del Fruto.	<i>Heliothis virescens</i>	0.09 - 0.100	-	3	0.01
	Gusano Perforador Del Fruto.	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.175	7	0.01
Espárrago	Bicho del Cesto.	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.08	-	28	0.01
	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.175	-	7	0.01
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.08-0.09	-	7	0.01
Alcachofa	Perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.15 - 0.2	28	0.1

PC: Período de carencia  
L.M.R: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo. Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar **EMACTIN 5% SG** de manera consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.  
Para el cultivo de Alcachofa solo realizar una aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO**  
Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**  
Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**  
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA



30.0 cm

2.0 cm

15.0 cm



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**GRÁNULOS SOLUBLES SG**

**Composición:**  
 Emamectin benzoato..... 50 g/Kg  
 Aditivos..... c.s.p 1 Kg

**Registro PQUA N° 971 - SENASA**

Titular del Registro:  
**AVGUST PERU SAC**  
 Cal, Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.  
 Formulador:  
 Beta Chemicals Ltd,  
 Rm,707, Bk, A, Kingsound Center, No. 116 Zizhu Yuan Road, Beijing 100097, China

Importado y Distribuido por:  


Contenido Neto: 1 Kg  
 Lote N°:  
 Fecha de Producción:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
 Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de **EMACTIN 5% SG**, a utilizar agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

**EMACTIN 5% SG**, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivos	Plaga		Dosis		PC (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Pimiento	Gusano Perforador Del Fruto.	<i>Heliothis virescens</i>	0.09 - 0.100	-	3	0.01
	Gusano Perforador Del Fruto.	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.175	7	0.01
Patato	Bicho del Cesto.	<i>Oryctes kirbyi</i>	0.08	-	28	0.01
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.175	-	7	0.01
Arándano	Gusano perforador grande de la ballota	<i>Heliothis virescens</i>	0.08-0.09	-	7	0.01
Alcachofa	Perforador grande de la ballota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.15 - 0.2	28	0.1

PC: Periodo de carencia  
 LMR: Limite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**  
 Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo. Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar **EMACTIN 5% SG** de manera consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.  
 Para el cultivo de Alcachofa solo realizar una aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO**  
 Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**  
 Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**  
 No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
 El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**





ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

35.0 cm

**“ LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto bájese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminado.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo químico: Avermectina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**  
**ESALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4**  
**AVGUST PERU SAC: 016522182**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**Emactin® 5% SG**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**GRÁNULOS SOLUBLES - SG**

**Composición:**

Emamectin benzoato..... 80 g/Kg  
 Aditivos..... C.s.p 1 Kg

**Registro PQUA N° 971 - SENASA**

Titular del Registro:

**AVGUST PERU SAC**

Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-At.

Formulador:

Beta Chemicals Ltd.

Rm.707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Importado y Distribuido por:



Contenido Neto: 25 kg  
 N° de lote:  
 Fecha de Producción:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de **EMACTIN 5% SG**, a utilizar agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

**EMACTIN 5% SG** debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivos	Plaga		Dosis		PC (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Pimiento	Gusano Perforador Del Fruto,	<i>Heliothis virescens</i>	0,09 - 0,100	-	3	0,01
Espárrago	Gusano Perforador Del Fruto,	<i>Heliothis virescens</i>	-	0,175	7	0,01
Palto	Bicho del Cesto,	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0,08	-	28	0,01
Maiz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0,175	-	7	0,01
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0,08-0,09	-	7	0,01
Alcachofa	Perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0,15 - 0,2	28	0,1

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo. Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar **EMACTIN 5% SG** de manera consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción. Para el cultivo de Alcachofa solo realizar una aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

20.0 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA