LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Anilinopirimidina
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.
En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por via oral.
En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco.
Brindar respiración artificial si fuese necesario.
Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.
Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 0800 – 1 – 3040 / **ESSALUD:** 117 (gratuito)
CISPROQUIM: 0801-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
No reutilizar los envases.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No permitir animales en el área tratada.
Peligroso para animales domesicos.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
El producto no debe aplicarse en zona con napa freática superficial o en suelo altamente permeable.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

BLUTBAD® 40% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión concentrada (SC)

Composición Química:

Pyrimethanil .... 400 g/L
Aditivos .... c.s.p. 1L

Registro PQUA N° .... - SENASA
Titular del Registro: IPEH

Ipeh

Importado y distribuido por:
INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 Nro 713 Oficina 205
San Isidro, Lima - Perú
Teléfono (01) 2267332 / E-mail: contacto@ipeh.org.pe

Contenido Neto: 20 L

Nº Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

Formulado por:
JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
15 Hubu Street. China. Nanjing. Jiangsu

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BLUTBAD® 40% SC es un fungicida de contacto preventivo y curativo, que se transporta acropetalmente y tiene acción translaminar. Inhibe la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para la infección, así evita y logra detener el proceso infectivo del patógeno. **BLUTBAD® 40% SC** puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión terrestre. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	**Enfermedad / Patógeno**		**Dosis (L/Ha)**	**PC (días)**	**LMR (ppm)**
	Nombre común	**Nombre científico**			
Vid	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	0.7 – 0.8 L/ha	3	0.05

PC: Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser de 15 días entre aplicaciones.
Se recomienda una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

FITOTOXICIDAD:

BLUTBAD® 40% SC en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO