LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- · Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: fenilpirazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuese necesario. Consultar al médico.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente. Llevar el paciente al médico.
- Teléfonos de emergencia: ESSALUD 411-8000 anexo 4, INFOSALUD 0800-10-828. CICOTOX 0800-1-3040 o 328-7700.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.



- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abeias v otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estangues o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos
- Peligroso para los animales domésticos, la flora y la fauna silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FAMOSS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil	200 g/L
Aditivosc.s.p)1.0 L

Reg. PQUA N° 214 - SENASA

Titular del Registro:

FARMEX S.A.

Formulado por:

SHENZHEN YANCHENG CHEMICALS CO., LIMITED

12A-12B, Xinhaofang Building, 11018 Shennan Road, Nanshan District, Shenzhen 518051, China.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia 148, piso 7, San Isidro, Lima 27, Perú Tel.: (511) 630-6400, Fax: (511) 630-6410.

Contenido neto 200 L

N° de lote Fecha de formulación Fecha de vencimiento :

NO NO NO **CORROSIVO INFLAMABLE EXPLOSIVO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FAMOSS es un insecticida que pertenece al grupo de los fenilpirazoles y que actúa por contacto e ingestión, posee una leve actividad sistémica.

FAMOSS se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manual, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad v luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (mL/cil	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	200 L)	(días)	(ppm)
Cebolla	Trips	Thrips tabaci	200 - 250	21	0.01
Papa	Gorgojo de los andes	Premnotrypes suturicallus	200	14	0.01
Arroz	Mosca minadora del arroz	Hydrellia wirthi	250	15	0.005
	Chinche de la espiga	Oebalus poecilus	250		0.003
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifila	200	21	0.005
Mango	Trípido de listas rojas	Selenothrips rubrocinctus	75 100	60	0.005

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña, considerando un máximo de 1 campaña por año. El intervalo de aplicación es de 14 días o más.

PERÍODO DE REINGRESO.

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener aleiado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD.

Es compatible con la mayoría de los plaquicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaquicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD.

FAMOSS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



































