

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Ligeramente irritante ocular.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para contener o transportar alimentos ni agua.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce en forma espontánea.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- No existe antídoto. Tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf. : 0800-1-3040 (Atención 24 horas)

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4

FITOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Devuelva el envase triple lavado a un centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Es peligrosos para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada,
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ECONOMIA

SEGURIDAD

TRIPLE LAVADO

AMBIENTE

KULGA 250 EW

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSION ACEITE EN AGUA-EW

COMPOSICION:

Tebuconazole..... 250 g/L

Aditivos..... c.s.p 1L

Registro PQUA N° 1471 - SENASA

Titular del registro:

FITOCORP SAC

Jr. Las Poncianas N° 147 Interior 2B. Urb. La Molina Vieja. La Molina- Lima

Teléfono: 016522182

Formulador:

KINYIELD INDUSTRY CO. LTD.

Rm.707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road,

Beijing 100097, China

Importador y Distribuidor:

Contenido Neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

KULGA 250 EW es un fungicida sistémico, que pertenece al grupo de los Triazoles, con acción protectante y curativa. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol produciendo el detenimiento del crecimiento y posterior muerte del hongo. Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua.

Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar KULGA 250 EW, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.06-0.1	0.3-0.5	21	2.0
Espárrago	Cercosporiasis	Cercospora asparagi	0.25	0.5	14	0.01
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.2	0.6	7	0.5
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.2	0.6	14	0.2
Café	Roya del cafeto	Hemileia vastatrix	0.25-0.3	-	30	0.1
	Ojo de gallo	Mycena citricolor				
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	0.2-0.4	0.2-0.4	35	2.0
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.2-0.25	0.4-0.5	21	0.05

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos(ppm:partes por millón)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar KULGA 250 EW al observarse los primeros síntomas de la enfermedad, con un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña. En el caso de vid, especialmente al brotamiento y en el espárrago a la apertura de los filocladios, considerando en este cultivo un intervalo entre aplicaciones de 15 a 30 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

KULGA 250 EW es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD

KULGA 250 EW no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO