

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- El producto es sensibilizante a la piel.
- El producto puede ser ligeramente irritante para los ojos y la piel.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Manténgalo lejos del fuego y de las chispas, guárdelo en un lugar fresco y seco. No permita que reciba mucho calor ya que esto puede ocasionar cambios en su composición química.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Ditiocarbamatos.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Si se produjera intoxicación involuntaria, provocar vómito dando a beber un vaso de agua con sal y hacer un lavado gástrico. En el caso de contacto con la piel, lavar con agua limpia y jabón todas las partes contaminadas.

En caso de intoxicación llamar a Essalud 4118000 anexo 4 - CICOTOX 0 800 1 3040

Nota al médico: Fungicida del grupo de los carbamatos que tiene como antídoto el sulfato de ATROPINA que se administra por vía intravenosa o intramuscular hasta la completa recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera del área tratada.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Dithane™



F-MB

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Mancozeb 430 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA No. 135-SENASA

Titular del registro: DuPont Perú S.A.C.

Av. República de Panamá 3531, Of. 1203 - Lima 27. Lima - Perú.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Apartado Aéreo 53895

Bogotá-Colombia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

ARIS Industrial S.A.

Av.Industrial S.A.

Lima 1 - Perú

Telf.: (51-1)3365428



Dow AgroSciences



CONTENIDO NETO: 20 litros

LOTE No.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© ™Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

1812

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Dithane™ F-MB es un fungicida de amplio espectro para el control de enfermedades fungosas de diversos cultivos. Si la aplicación incluye insecticidas y/o fungicidas, estos deberán mezclarse por separado con el fin de obtener una mezcla homogénea. Dithane™ F-MB, no debe mezclarse con surfactantes y/o emulsificantes porque estos ya están incluidos en la formulación. Disuelva completamente la cantidad de Dithane™ F-MB a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 1/3 ó 3/4 del total. Complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Cuando vaya a realizar mezclas con otros productos, es necesario hacer una prueba previa.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	DOSIS L/ha	DOSIS %	P.C.*	L.M.R.**
PAPA Y TOMATE	Hielo o Rancho Tizón temprano	Phytophthora infestans Alternaria solani	2-3 2-3	-	7 7	0.2 2.5
ALGODÓN	Mancha negra	Alternaria tenuis	2-3	-	7	0.05
AJÍ Y ROCOTO	Cercosporiosis	Cercospora capsici	2-3	-	7	5 4.0
HABA	Mancha de la hoja	Cercospora fabae	2-3	-	7	1
MANDARINA	Podredumbre gris Ácaro del tostado	Botrytis cinerea Phyllosticta oleivora	3-5 3-5	-	7 7	5
MANGO	Antracnosis	Colletotrichum sp	4-6	-	7	2
CEBOLLA	Mildiu veloso	Peronospora destructor	4-6	-	7	1.5
AJO	Mancha púrpura Añublo de la hoja	Alternaria porri Botrytis alli	4-6 4-6	-	7 7	0.6
PLÁTANO	Sigatoka amarilla Sigatoka negra	Cercospora sp Mycosphaerella sp	3-3.5 3-3.5	-	7 7	2
ARROZ	Mancha lineal Mancha circular	Cercospora oryzae Helminthosporium sp	4-6 4-6	-	7 7	0.05
MELÓN Y SANDÍA	Mildiu	Pseudoperonospora cubensis	3-3.5	-	7	1.5
CEBADA Y TRIGO	Oidium	Erysiphe graminis	2-3	-	7	0.05
ESPÁRRAGO	Cercosporiosis Stemphylium	Cercospora asparagi Stemphylium vesicarium	2-3 3-5	-	7 7	0.1
GRANADO	Corazón negro	Alternaria alternata	2-3	-	7	0.05
VID	Mildiu	Plasmopara viticola	-	0.4	14	1.5

*P.C. = Período de carencia **L.M.R. = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Dithane™ F-MB es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

