

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Imidazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muestrele la etiqueta Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir el paciente al vómito.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe dar respiración artificial.

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento es sintomático. No existe ANTIDOTO específico.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX, telf.: 0-800-1-30-40 (Gratis)  
 ESSALUD: 117 (Gratis)  
 CISPROQUIM: 0-800-5-0847  
 AGROKLINGE: (01)612-6565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



# AURA<sup>®</sup> 450 EC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Prochloraz..... 450 g/L  
 Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA N°

Titular del registro:



AGROKLINGE S.A  
 Av. Calle René Descartes 311,  
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
 Lima - Perú. Telf.: 348-1103, Fax: 348-1020 RUC N°:  
 20307150981

Formulado por:  
**Shangai E-Tong Chemical Co., Ltd**  
 N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,  
 Songjiang District, Shangai, China.

**Contenido Neto: 1 L**

Lote N°:  
 F. de Formulación:  
 F. de Vencimiento:



**NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** AURA 450 EC es un fungicida de contacto y efecto translaminar, con acción preventiva y curativa. Controla un amplio rango de hongos fitopatógenos, que producen manchas foliares y pudriciones en diferentes órganos de las plantas. AURA 450 EC se aplica en aspersión foliar, tratamiento de semillas y en post cosecha. AURA 450 EC se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/cil. 200 L		
ESPÁRRAGO	"Fusariosis"	<i>Fusarium oxysporum</i>	100-200	15	0.05
TOMATE	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	100-150	15	0.05
PAPA	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	150-200	15	0.05

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400-500 L/ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar AURA 450 EC (i.a Prochloraz) hasta 2 aplicaciones como máximo por campaña, considerando 2 campañas al año para los cultivos de espárrago y tomate. Considerar una frecuencia entre aplicaciones de 10 a 14 días.

Aplicar el producto como protectante, antes de que ocurran las infecciones, o apenas aparezcan los primeros síntomas visibles de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.  
**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina como el caldo bordelés.  
**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

14 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

