

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Imidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir el paciente al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe dar respiración artificial.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTIDOTO específico.

TELEF. DE EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A. (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



AURA® 450 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Prochloraz..... 450 g/L

Aditivos..... csp 1 L

Registro PQUA N° 1510 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306, Santiago de Surco.

Lima-Perú, Telf.: (01) 641-0000.

Formulado por:

Shangai E-Tong Chemical Co., Ltd.

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,

Songjiang District, Shanghai, China

Telf. +86-21-51698968.

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: AURA 450 EC es un fungicida de contacto y efecto translaminar, con acción preventiva y curativa. Controla un amplio rango de hongos fitopatógenos que producen manchas foliares y pudriciones en diferentes órganos de las plantas. AURA 450 EC se aplica en aspersión foliar, tratamiento de semillas y en post cosecha. AURA 450 EC se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS ml/ 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ESPÁRRAGO	“Fusariosis”	<i>Fusarium oxysporum</i>	100-200	15	0.05
TOMATE	“Pudrición gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	100-150	15	0.05
PAPA	“Tizón temprano”	<i>Alternaria solani</i>	150-200	15	0.05
ARÁNDANO	“Muerte regresiva”	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	200	50	0.03

PC: Período de carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar AURA 450 EC (i.a. Prochloraz) hasta 2 aplicaciones como máximo por campaña, considerando 2 aplicaciones por año para espárrago y tomate. Considera una frecuencia entre aplicaciones de 10 a 14 días. Aplicar el producto como protectante, antes de que ocurran las infecciones, o apenas aparezcan los primeros síntomas visibles de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina como el caldo bordelés.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Ur: 080119 V2

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm