

Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Imidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir el paciente al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe dar respiración artificial.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

TEL. DE EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A. (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



AURA® 450 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Prochloraz..... 450 g/L

Aditivos..... csp 1 L

Registro PQUA N° 1510 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306, Santiago de Surco.

Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000.

Formulado por:

Shangai E-Tong Chemical Co., Ltd.

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,

Songjiang District, Shanghai, China

Telf. +86-21-51698968.

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: AURA 450 EC es un fungicida de contacto y efecto translaminar, con acción preventiva y curativa. Controla un amplio rango de hongos fitopatógenos que producen manchas foliares y pudriciones en diferentes órganos de las plantas. AURA 450 EC se aplica en aspersión foliar, tratamiento de semillas y en post cosecha. AURA 450 EC se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/ 200 L		
ARANDANO PALTO	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.2	50	0.03
ESPÁRRAGO	"Fusariosis"	<i>Fusarium oxysporum</i>	-	0.1-0.2	15	0.05
PAPA	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	-	0.15-0.2	15	0.05
TOMATE	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.1-0.15	15	0.05
VID	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1.25	-	70	0.03

PC: Período de carencia / **LMR:** Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Ver hoja informativa

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina como el caldo bordelés.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

© Marca Registrada

Ur: 080719 V2



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm