

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.
- No se debe comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Después de terminada la aplicación, deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas, con abundante agua y jabón.
- Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugar fresco y - seco alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.
- No contaminar fuentes de agua.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas. Usar lentes, máscara, guantes, botas, mameluco u overol completo y gorro.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Fenilurea
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Si los síntomas persisten llame inmediatamente al médico.
En caso de ingestión, no provocar el vómito. Enjuaguese la boca y de a beber abundante agua. Busque ayuda médica.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos y busque ayuda médica si los síntomas persisten.
En caso de inhalación, trasladar al aire libre . Mantener al paciente en reposo y abrigado. Si los síntomas persisten llame inmediatamente a un médico.

Antídoto:

No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
No reenvasar o depositar el contenido de plaguicidas en otros envases.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases destrúyalos.
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
El aplicador debe tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Thidiazuron, 50 g/l
Aditivos, csp 1 L

Reg. RCP N° 008-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience AG
D-51368
Leverkusen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro Lima - Perú
Telf. 211-3800

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Contenido
Neto: 1 litro

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del Grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CENTELLA SC es un regulador de crecimiento cuyo ingrediente activo es Thidiazuron. En aplicaciones tempranas el producto estimula el crecimiento de brotes y al ser aplicado sobre bayas incrementa el tamaño de las mismas.

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	DOSIS		PC * (días)	LMR** (ppm)
	ml / cilindro	%		
VID	10 - 12	0.005 - 0.006	45	0.02

PC *= Periodo de Carencia (días) LMR** = Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)
N.a = No aplica

Utilizar la dosis en porcentaje o ml/cilindro realizando una calibración previa y considerando una buena cobertura de las plantas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar hasta dos aplicaciones por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con el cultivo recomendado siguiendo las indicaciones de uso de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

