LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# **75 PS**

# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# **INSECTICIDA AGRÍCOLA POLVO SOLUBLE - SP**

#### COMPOSICIÓN:

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforados
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. - Antídoto: Sulfato de atropina a la dosis de 1 mg a 2 mg por vía intravenosa hasta lograr
- completar atropinización. Se puede usar 2-PAM en conjunción con atropina, pero no
- Teléfonos para emergencias: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 117

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un insecticida de amplio espectro del grupo de los organofosforados que actúa por contacto y posee también actividad sistémica en las plantas. Impregnado en las semillas protege plántulas del ataque de plagas en sus primeros estadios de crecimiento. Impregnación de semilla: Para el control de gusano cortador *Feltia sp.* usar **ORTHENE® 75 PS** a la dosis de 500 gramos por 100 kilogramos de semilla, preparando el producto en una solución con agua suficiente para mojar toda la semilla (p.e. 1 litro para 100 kg de semilla).

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USO

CULTIVO	Plaga		Dosis			P.C.	L.M.R.
	Nombre científico	Nombre común	%	kg/ha	kg/ cilindro	(días)	(ppm)
Algodón	Aphis gossypii	Pulgón de la melaza	0.075-0.1	0.3-0.5	-	14	2.0
Dana	Tuta absoluta	Polilla	0.1-0.2	0.5-1.0	-	14	0.01
Papa	Premnotrypes suturicallus	Gorgojo de los Andes	-	-	0.3-0.5		
Zapallo	Diaphania nitidalis	Perforador de frutos	0.2-0.3	1.0-1.5	-	7	4.0
Col	Brevicoryne brassicae	Pulgón	0.1-0.2	0.5-1.0	-	7	8.0
Tabaco	Heliothis virescens	Gusano de la yema	0.15-0.3	0.75- 1.5	-	7	-
Maìz, algodòn	Feltia sp.	Gusano cortador	500 g x 100 Kilogramo de semilla			-	-

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón) P.C.: Periodo de carencia (días) FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 7-10 días.

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los otros productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD ORTHENE® 75 PS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

## Reg. N° 304-96-AG-SENASA

### Titular del registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C. Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague Jesús María - Lima - Perú



## Formulado por:

Arysta LifeScience Do, Brasil Indústria Química E Agropecuária Ltda. Rod. Sorocaba-Pilar do Sul, km 122 - Salto de Pirapora, San Pablo - Brasil

## Importado y Distribuido por:

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERÚ Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410 www.farmex.com.pe



ET304-96-AGV003-10

CI 50

Fecha de Formulación: N° de lote: Contenido Neto: 10 kg Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** 

**NO INFLAMABLE** 

**NO EXPLOSIVO** 

# LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

APROBADO POR:















0,50 cm

N° DOCUMENTO: FRMX-AR-1081

CÓDIGO: 2007567

VERSIÓN: 01

**VIGENCIA**: 09 / 02 / 2016

**DENOMINACIÓN:** PROVEEDOR: MATERIAL: N° DE COLORES: N° DE PANTONES:

ETIQ. ADH. ORTHENE 75 PS x 10 Kg. UNIGRAF S.A.C ADHESIVO DE SEGURIDAD

4 COLORES VERDE PANT. 348 C. PAG. 38 NEGRO

VERDE PANT. 382 C. AZUL PANT. 293 C. □ BARNIZ UV

PARA BOLSA DE PAPEL

**SELLO** 

**OBSERVACIONES:** 1.- Nueva.

USO:

# **75 PS**

# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# **INSECTICIDA AGRÍCOLA POLVO SOLUBLE - SP**

#### COMPOSICIÓN:

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforados
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. - Antídoto: Sulfato de atropina a la dosis de 1 mg a 2 mg por vía intravenosa hasta lograr
- completar atropinización. Se puede usar 2-PAM en conjunción con atropina, pero no
- Teléfonos para emergencias: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 117

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INSTRUCCIONES DE USOY MANEJO
Es un insecticida de amplio espectro del grupo de los organofosforados que actúa por contacto y
posee también actividad sistémica en las plantas. Impregnado en las semillas protege plántulas del
ataque de plagas en sus primeros estadios de crecimiento.
Impregnación de semilla: Para el control de gusano cortador Feltia sp. usar ORTHENE® 75 PS a la
dosis de 500 gramos por 100 kilogramos de semilla, preparando el producto en una solución con agua
suficiente para mojar toda la semilla (p.e. 1 litro para 100 kg de semilla).

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USO

CULTIVO	Plag	a	Dosis		P.C.	L.M.R.	
	Nombre científico	Nombre común	%	kg/ha	kg/ cilindro	(días)	
Algodón	Aphis gossypii	Pulgón de la melaza	0.075-0.1	0.3-0.5	-	14	2.0
Dono	Tuta absoluta	Polilla	0.1-0.2	0.5-1.0	-	14	0.01
Papa	Premnotrypes suturicallus	Gorgojo de los Andes	-	-	0.3-0.5	14	0.01
Zapallo	Diaphania nitidalis	Perforador de frutos	0.2-0.3	1.0-1.5	-	7	4.0
Col	Brevicoryne brassicae	Pulgón	0.1-0.2	0.5-1.0	-	7	8.0
Tabaco	Heliothis virescens	Gusano de la yema	0.15-0.3	0.75- 1.5	-	7	-
Maìz, algodòn	Feltia sp.	Gusano cortador	500 g x 100 Kilogramo de semilla			-	-

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón) P.C.: Periodo de carencia (días)
FRECUENCIA Y ÉPOCADE APLICACIÓN
No expliamento de la companya de

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 7-10 días.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los otros productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD ORTHENE® 75 PS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

## Reg. N° 304-96-AG-SENASA

### Titular del registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C. Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague Jesús María - Lima - Perú



### Formulado por:

Arysta LifeScience México Carretera Satillo - Monterrey Km 15.5 CP 25900, Ramos Arizpe Coahuila, México Telf: 52 (844) 8660 112

## Importado y Distribuido por:

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERÚ Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410 www.farmex.com.pe



Fecha de Formulación: N° de lote: Contenido Neto: 10 kg Fecha de Vencimiento

## **NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE** 

**NO EXPLOSIVO** 

# LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

APROBADO POR:













0,50 cm

N° DOCUMENTO: FRMX-AR-1081

CÓDIGO: 2007567

VERSIÓN: 01

**VIGENCIA**: 09 / 02 / 2016

**DENOMINACIÓN:** PROVEEDOR: MATERIAL: N° DE COLORES: N° DE PANTONES: ETIQ. ADH. ORTHENE 75 PS x 10 Kg. UNIGRAF S.A.C ADHESIVO DE SEGURIDAD

4 COLORES VERDE PANT. 348 C. PAG. 38 NEGRO

VERDE PANT. 382 C. AZUL PANT. 293 C. □ BARNIZ UV

**SELLO** 

**OBSERVACIONES:** 1.- Nueva.

USO:

PARA BOLSA DE PAPEL

CI 50

# **75 PS**

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# **INSECTICIDA AGRÍCOLA POLVO SOLUBLE - SP**

#### COMPOSICIÓN:

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforados
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto
- fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Antídoto: Sulfato de atropina a la dosis de 1 mg a 2 mg por vía intravenosa hasta lograr completar atropinización. Se puede usar 2-PAM en conjunción con atropina, pero no
- Teléfonos para emergencias: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 117

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un insecticida de amplio espectro del grupo de los organofosforados que actúa por contacto y posee también actividad sistémica en las plantas. Impregnado en las semillas protege plántulas del ataque de plagas en sus primeros estadios de crecimiento. Impregnación de semilla: Para el control de gusano cortador *Feltia sp.* usar **ORTHENE® 75 PS** a la dosis de 500 gramos por 100 kilogramos de semilla, preparando el producto en una solución con agua suficiente para mojar toda la semilla (p.e. 1 litro para 100 kg de semilla).

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USO

CULTIVO	Plaga		Dosis			D.C	L.M.R.
	Nombre científico	Nombre común	%	kg/ha	kg/ cilindro	P.C. (días)	
Algodón	Aphis gossypii	Pulgón de la melaza	0.075-0.1	0.3-0.5	-	14	2.0
Papa	Tuta absoluta	Polilla	0.1-0.2	0.5-1.0	-	14	0.01
	Premnotrypes suturicallus	Gorgojo de los Andes	-	-	0.3-0.5		
Zapallo	Diaphania nitidalis	Perforador de frutos	0.2-0.3	1.0-1.5	-	7	4.0
Col	Brevicoryne brassicae	Pulgón	0.1-0.2	0.5-1.0	-	7	8.0
Tabaco	Heliothis virescens	Gusano de la yema	0.15-0.3	0.75- 1.5	-	7	-
Maìz, algodòn	Feltia sp.	Gusano cortador	500 g x 100 Kilogramo de semilla			-	-

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón) P.C.: Periodo de carencia (días) FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 7-10 días.

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los otros productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD ORTHENE® 75 PS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

## Reg. N° 304-96-AG-SENASA

### Titular del registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C. Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague Jesús María - Lima - Perú



Formulado por: Arysta LifeScience North America, LLC 15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC 27513 USA

## Importado y Distribuido por:

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERÚ Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410 www.farmex.com.pe



ET304-96-AGV003-10

CI 50

Fecha de Formulación: N° de lote: Contenido Neto: 10 kg Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** 

**NO INFLAMABLE** 

**NO EXPLOSIVO** 

# LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

APROBADO POR:















0,50 cm

N° DOCUMENTO: FRMX-AR-1081

CÓDIGO: 2007567

VERSIÓN: 01

**VIGENCIA**: 09 / 02 / 2016

**DENOMINACIÓN:** PROVEEDOR: MATERIAL: N° DE COLORES: N° DE PANTONES: ETIQ. ADH. ORTHENE 75 PS x 10 Kg. UNIGRAF S.A.C ADHESIVO DE SEGURIDAD

4 COLORES VERDE PANT. 348 C. PAG. 38 NEGRO VERDE PANT. 382 C.

AZUL PANT. 293 C. □ BARNIZ UV PARA BOLSA DE PAPEL

**SELLO** 

**OBSERVACIONES:** 1.- Nueva.

USO:

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# **75 PS**

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# **INSECTICIDA AGRÍCOLA POLVO SOLUBLE - SP**

#### **COMPOSICIÓN:**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforados
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto
- fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Antídoto: Sulfato de atropina a la dosis de 1 mg a 2 mg por vía intravenosa hasta lograr completar atropinización. Se puede usar 2-PAM en conjunción con atropina, pero no
- Teléfonos para emergencias: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 117

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un insecticida de amplio espectro del grupo de los organofosforados que actúa por contacto y posee también actividad sistémica en las plantas. Impregnado en las semillas protege plántulas del ataque de plagas en sus primeros estadios de crecimiento. Impregnación de semilla: Para el control de gusano cortador *Feltia sp.* usar **ORTHENE® 75 PS** a la dosis de 500 gramos por 100 kilogramos de semilla, preparando el producto en una solución con agua suficiente para mojar toda la semilla (p.e. 1 litro para 100 kg de semilla).

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USO

CULTIVO	Plaga		Dosis			D.C	L.M.R.
	Nombre científico	Nombre común	%	kg/ha	kg/ cilindro	P.C. (días)	
Algodón	Aphis gossypii	Pulgón de la melaza	0.075-0.1	0.3-0.5	-	14	2.0
Papa	Tuta absoluta	Polilla	0.1-0.2	0.5-1.0	-	14	0.01
	Premnotrypes suturicallus	Gorgojo de los Andes	-	-	0.3-0.5		
Zapallo	Diaphania nitidalis	Perforador de frutos	0.2-0.3	1.0-1.5	-	7	4.0
Col	Brevicoryne brassicae	Pulgón	0.1-0.2	0.5-1.0	-	7	8.0
Tabaco	Heliothis virescens	Gusano de la yema	0.15-0.3	0.75- 1.5	-	7	-
Maìz, algodòn	Feltia sp.	Gusano cortador	500 g x 100 Kilogramo de semilla			-	-

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón) P.C.: Periodo de carencia (días) FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 7-10 días.

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los otros productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD ORTHENE® 75 PS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

## Reg. N° 304-96-AG-SENASA

### Titular del registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C. Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague Jesús María - Lima - Perú



#### Formulado por: Farmex S.A.

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERÚ Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410 www.farmex.com.pe

## Importado y Distribuido por:

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERÚ Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410 www.farmex.com.pe



ET304-96-AGV003-10

CI 50

Fecha de Formulación: N° de lote: Contenido Neto: 10 kg Fecha de Vencimiento

**NO CORROSIVO** 

**NO INFLAMABLE** 

**NO EXPLOSIVO** 

# LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**















0,50 cm

N° DOCUMENTO: FRMX-AR-1081

CÓDIGO: 2007567

VERSIÓN: 01

**VIGENCIA**: 09 / 02 / 2016

**DENOMINACIÓN:** PROVEEDOR: MATERIAL: N° DE COLORES: N° DE PANTONES: ETIQ. ADH. ORTHENE 75 PS x 10 Kg. UNIGRAF S.A.C ADHESIVO DE SEGURIDAD

4 COLORES VERDE PANT. 348 C. PAG. 38 NEGRO VERDE PANT. 382 C.

AZUL PANT. 293 C. □ BARNIZ UV

PARA BOLSA DE PAPEL

APROBADO POR:

**OBSERVACIONES:** 1.- Nueva.

USO:

**SELLO**