

# CY GAL<sup>®</sup> 180

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - (EC)

**COMPOSICIÓN:**

Cyhalofop butyl ..... 180 g/l  
Aditivos ..... c.s.p. 11

Registro PQUA N° 1508-SENASA

**Titular del Registro:**

**ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.**  
Av. Primavera N° 543, Piso 4 - San Borja  
Lima - Perú.

**Formulado por:**

**ROTAM AGRO COLOMBIA SAS**  
Carrera 22 No. 98 - 82, ofi. 703  
Bogotá D.C. - Colombia.



**Importado y Distribuido por:**

**ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.**  
Av. Primavera N° 543, Piso 4 - San Borja  
Lima - Perú. Tel.: (51) 942718175

Fecha de Formulación:

No. de Lote:

Contenido neto: 5 L

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Aryloxyphenoxypropionate.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:**

SAMU: 106  
ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.: (511) 951 313808

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- "Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CY GAL® 180** es un herbicida post emergente, que es absorbido vía foliar únicamente y sin actividad sobre el suelo. Como herbicida sistémico, es fácilmente absorbido por el tejido de la planta, siendo moderadamente móvil por el floema y acumulándose en los tejidos meristemáticos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Aroz	Moco de pavo Pata de gallina Cadillo	<i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Cenchrus echinatus</i>	1 - 1.5	45	0.4

**P.C.: PERIODO DE CARENZIA:** Período transcurrido entre la última aplicación y la cosecha.

**LMR:** Límite máximo de residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar 1 sola aplicación por ciclo de cultivo, en forma post emergente.

**PERIODO DE REINGRESO**

Cuando la aplicación haya secado.

**COMPATIBILIDAD**

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad, **CY GAL® 180** no es compatible con productos muy alcalinos o muy ácidos.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

