

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:** Triazopirimidina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente.
 - En caso de contaminación con la piel, quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
 - En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
 - Antídoto: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 411-8000 opción 4; CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



RICEMASTER 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Penoxsulam 240 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° 1515 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCIAS SAC



Av. El Polo N°401, Oficina 610.
Santiago de Surco, Lima, Perú.
Teléfono: (511) 713-9960
rainbowchem@rainbowchem.com
www.rainbowchem.com

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW

CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development
Area, Weifang, Shandong 262737.
China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.

Calle E. Nerini N°711 Dpto 204 Urb. El Pino. San Luis, Lima.
Telf.: (01) 547-0638 / http://www.inveragro.com.pe

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 500 ml

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RICEMASTER 240 SC es un herbicida sistémico selectivo, de acción pre y post emergente, perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas, cuyo uso se recomienda para el control de *Echinochloa colonum*, malezas de hoja ancha y ciperáceas en el cultivo de arroz.

Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad de **RICEMASTER 240 SC** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continua agitando la mezcla, hidráulica o manualmente.

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Liendre puerco Moco de pavo Gramma blanca Cortadera Coquito	<i>Echinochloa colonum</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Cynodon esculentus</i> <i>Cyperus difformis</i>	0,1- 0,125	45	0,02

PC: Periodo de carencia

L.M.R: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **RICEMASTER 240 SC** (i.a. Penoxsulam) una aplicación por campaña como máximo, considerando una sola campaña por año. Se recomienda aplicar sobre suelo húmedo y bien preparado. Se debe aplicar sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área hasta después de 24 horas de ser aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

RICEMASTER 240 SC no tiene incompatibilidad con insecticidas y herbicidas de uso común en el cultivo de arroz, sin embargo se recomienda realizar una pre-mezcla. Para usarlo en mezcla con otros insecticidas y herbicidas, realice previamente una pequeña prueba de compatibilidad para verificar la estabilidad de la mezcla.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

