

“LEA LA ETIQUETA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazopirimidina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente
- En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)

ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4

CAISAC (01) 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva

El producto no debe aplicarse en zonas con capas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.

En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



RICEMASTER® 240 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Penoxsulam..... 240 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

ESPACIO PARA LOGOTIPOS

Titular de registro, Importador y Distribuidor:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo 401, Of. 610, Lima 33, PERU

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic

Development Area, Weifang, Shandong 262737, China

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

Contenido Neto: 20 Litros

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RICEMASTER® 240 SC es un herbicida sistémico selectivo, de acción pre y post emergente, perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas, cuyo uso se recomienda para el control de *Echinochloa colonum*, malezas de hoja ancha y ciperáceas en el cultivo de arroz.

Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad de **RICEMASTER 240 SC®** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla mecánica, hidráulica o manualmente.

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO			
ARROZ	Liendre puero Moco de pavo Gramma blanca Cortadera Coquito	<i>Echinochloa Colonum</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Cyperus esculentus</i> <i>Cyperus difformis</i>	0.1-0.125	45	0.01

P.C. Periodo de carencia

LMR Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **RICEMASTER® 240 SC** (i.a. Penoxsulam) una aplicación por campaña como máximo, considerando una sola campaña por año.

Se recomienda aplicar sobre suelo húmedo y bien preparado. Se debe aplicar sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área hasta después de 24 horas de ser aplicado el producto

COMPATIBILIDAD

RICEMASTER® 240 SC no tiene incompatibilidad con insecticidas y herbicidas de uso común en el cultivo de arroz, sin embargo se recomienda realizar una pre-mezcla.

Para usarlo en mezcla con otros insecticidas y herbicidas, realice previamente una pequeña prueba de compatibilidad para verificar la estabilidad de la mezcla.

FITOTOXICIDAD:

RICEMASTER 240 SC® es un herbicida totalmente selectivo al cultivo del arroz mientras se tenga en cuenta las recomendaciones de uso del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

