14.0 x 28.0 cm

10-02-2025

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

-No limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de las partes del equipo.
-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
-Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.
-Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
-Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
-PAL'GUSANO-AG debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos prolongados el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30°C.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-En caso de contaminación de los ojos con la solución concentrada, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
-En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, entre otros, llevar al paciente al médico mas cercano.
-Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.
-No existe antídoto especifico.
-En caso de emergencia toxicológica llamar:

**SAMU: 106 ó Titular NOVAGRO-AG S.A.C.: +51 (044) 273330**

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes para evitar la deriva por el viento.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos o restos de aplicación.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# PAL'GUSANO-AG®

**AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

## COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo:
*Bacillus thuringiensis* var. kurstaki.....114.2 g/L
(Contiene 8000 UI/mg)
*Bacillus thuringiensis* var. aizawai.....114.2 g/L
(Contiene 8000 UI/mg)
Aditivos..... c.s.p 1 L

**Registro PBUA N° 389 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**
**NOVAGRO-AG S.A.C.**
Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.
Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

**FORMULADOR:**
**NOVAGRO-AG S.A.C.**
Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.
Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

**DISTRIBUIDOR:**
**NOVAGRO-AG S.A.C.**
Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.
Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Fecha de formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **25 L**
Fecha de Vencimiento :

NovAgro-AG®
*Ayudamos a producir frutas y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor*

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **PAL'GUSANO-AG** es un insecticida biológico a base de dos cepas *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* y *Bacillus thuringiensis* var. *aizawai* , que controla insectos plaga como lepidopteros, actúa por ingestión, después de ser ingerido por la larva del insecto, le causa inapetencia, deteniendose el daño al cultivo. Las larvas afectadas mueren en un lapso de 2 a 4 días.
- **PAL'GUSANO-AG** está exento de tolerancias y periodos de carencia.
- En 3 a 5 litros de agua diluir el coadyuvante en la dosis recomendada.
- En la pre-mezcla (a) diluir la dosis recomendada de **PAL'GUSANO-AG** y agitar muy bien (usar escobillón de lavar)
- Es recomendable preparar la mezcla justo antes de la aplicación y usarse todo el producto pre mezclado antes de las 4 horas siguientes.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo | Plagas | | Dosis | | PC | LMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | L/Ha | L/200L | | |
| Arándano | Gusano perforador | *Chloridea virescens* | 0.9 - 1.5 | 0.3 - 0.5 | N.A. | Exento |
| Espárrago | Gusano cogollero | *Spodoptera frugiperda* | 0.9 - 1.5 | 0.3 - 0.5 | N.A. | Exento |
| Espárrago | Copitarsia | *Copitarsia decolora* | 2.62 - 3.5 | 0.75 - 1.0 | N.A. | Exento |
| Granado | Gusano perforador | *Pococera atramentalis* | 3.75 - 5.0 | 0.75 - 1.0 | N.A. | Exento |
| Holantao | Gusano perforador | *Chloridea virescens* | 2.25 - 3.0 | 0.75 - 1.0 | N.A. | Exento |
| Mango | Gusano medidor de la hoja | *Chrysodeixis (=Pseudoplusia) includens* | 1.90 - 2.7 | 0.60 - 0.7 | N.A. | Exento |
| Palto | Bicho del cesto | *Oiketicus kirbyi* | 3.75 - 5.0 | 0.75 - 1.0 | N.A. | Exento |
| Palto | Gusano medidor | *Sabulodes aegrotata* | 2.06 - 2.75 | 0.75 - 1.0 | N.A. | Exento |
| Pimiento | Gusano ejercito | *Spodoptera frugiperda* | 2.25 - 3.0 | 0.75 - 1.0 | N.A. | Exento |
| Vid | Gusano perforador | *Pholus ampelophaga* | 2.81 - 3.75 | 0.75 - 1.0 | N.A. | Exento |

*PC*:Periodo de carencia en días *LMR*:Límite máximo de residuos en ppm Exento según EPA
*N.A.:No Aplica*

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda **PAL'GUSANO-AG** cuando se observen los primeros indicios de plaga, aplicar las veces necesarias considerando 7 a 10 días entre aplicación como mínimo para acortar el ciclo biológico de la plaga.

## PERIODO DE REINGRESO

4 horas después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

## COMPATIBILIDAD

**PAL'GUSANO-AG** no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o pH alcalino. No es tóxico para las plantas.

## FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

**PRECAUCIÓN**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA