

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o se inhala. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reinsertar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar en un lugar seco, alejado de alimentos, medicamentos, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidades de viento mayor a 10kmh.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- No aplicar si hay viento fuerte o cuando cambiasen, lavar los ojos y la piel con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Spynosin.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar se la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligro para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna acuática.
- Nocivo para el ganado. Mantenerlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Nocivo para los peces, aves acuáticas, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligro para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases usados.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuencas de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No aplicar donde emplear todas las medidas necesarias para la conservación.
- No contaminar las aguas con los restos de la aplicación o el sobranado del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.



SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
 Spinosad : 120 g/L
 Aditivos : c.s.p. 1L

Registro POUA N° 510 - SENASA



Titular de Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **4L**

F. de Form:
Nº Lote:
F. de Venc:

Formulado por

PROCESOS BIOQUÍMICOS
CLARAMUNT FORNER, S.L.
les Deu, 15, 46138 Rafelbunyol
Valencia-España

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPLINTER® 120 SC es un bioinsecticida de amplio espectro de acción.

Tiene como ingrediente activo al spino sad, la cual actúa sobre los receptores post-sinápticos de la acetilcolina nicotínica y los receptores GABA.

SPLINTER® 120 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, pihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200 L	L/ha		
ALCACHOFA	"Heliothis"	<i>Heliothis virescens</i>	75	-	2	0.2
CEBOLLA	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	50 - 100	-	3	0.2
PIMIENTO	"Gusano perforador de frutos"	<i>Heliothis virescens</i>	100	0.2	1	0.4
	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	80	-	1	0.3
VID	"Trips"	<i>Frankliniella occidentalis</i>	50 - 100	-	7	0.5

P.C.: Período de Carencia (días)

L.M.R: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de **SPLINTER® 120 SC**. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

SPLINTER® 120 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

SPLINTER® 120 SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.