

PILARKING 70 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Imidacloprid..... 700g/kg
Aditivos c.s.p. c.s.p.1kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 614-1500 Fax: 614-1517

FARMAGRO S.A. 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

PILARQUIM SHANGHAI, RPC

1500 Hangtang Road, Jinhui Town, Fengxian

District, Shanghai, 201405 P.R. of China

Peso Neto:

Número de Lote:

F. de Formulación:

F. de Fabricación

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de recuperación.

En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-13040

(Atención 24 horas)

EsSalud: 117 (Línea Gratuita)

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abeja u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO:

PILARKING 70WP, es un insecticida altamente sistémico elaborado a base de Imidacloprid, ingrediente activo que posee acción de contacto e ingestión.

Es utilizado para el control de plagas de cultivos agrícolas, las aplicaciones van directamente al follaje.

PILARKING 70WP, se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar PILARKING 70WP (i.a imidacloprid) un máximo de una aplicación por campaña, al observarse los primeros síntomas de la plaga o cuando este presente un porcentaje donde afecte significativamente la cosecha.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

PILARKING 70WP, es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina y productos foliares.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Cuadro de usos:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/Cil	Kg/Ha		
VID	Filoxera	<i>Phylloxera vitifoliae</i>	50	0.163	14	1

P.C. : Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

