

PANTONE YELLOW C

TRILUX

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Spiroxamine	250 g/L
Tebuconazole	167 g/L
Triadimenol	43 g/L
Aditivos	1 L

MONTANA S.A.

MONTANA S.A.
COMUNICAZIONE PUBBLICA

MONTANA S.A.
 Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfonos: (511) 4193000
 E-mail: info@corpmontana.com

Lot#:

Fecha de Exp.:

NO EXPLOSIVO

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

• El producto es dañino, no ingerir.

El producto causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forajidos.
Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y lavar la ropa en las lavanderas 24 horas después de la aplicación.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Evitar la aplicación cuando haya mucho viento.
Ningún vegetal que haya sido tratado con plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

[illegible]

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, títurándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Desuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todos las medidas necesarias para controlar la ventosa.
- En caso de derrame, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar contaminación ambiental.
- El producto no debe aplicarse en zonas con caídas, ríos, arroyos o en suelos altamente permeables.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

- TRICUR es un fungicida sistémico de amplio espectro que actúa inhibiendo la biosíntesis de esterol en diferentes puntos de la cadena a nivel de la membrana celular de los hongos.

- TRICUR presenta propiedades sistémicas dentro de la planta moviéndose en forma translamilar y ascendente. Sobre el patógeno tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante. Así mismo posee cualidades antiparasitarias.

- **TRICUR** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSES		PC (dias)	LAR (mm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/20ul	L/Ha		
Capsicum annuum	Odium	<i>Leveillula taurica</i>	0.4	1.0	38	0.5 Spray 1.0 Tela shade 5.0 Tritidrenol
						1.0 Spray 1.0 Tela shade 2.0 Tritidrenol
Vid	Okiloidis	<i>Erysiphe necator</i>	0.15 - 0.25	-	35	

PC: Período de Carencia
UMR: Límite Máximo de Resíduos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una buena cobertura sobre toda la planta.
- Realizar como máximo dos aplicaciones con un intervalo de 10 a 14 días entre aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

PERÍODO DE REINGRESSO

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILINDO

COMPATIBILIDAD
TRACUR es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

ПОТОЧНОСТЬ

TRACUR no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSES AND ANALYSIS

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.