

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- ## PRIMEROS AUXILIOS

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
- CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita)
 - ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN:

AZOXYSTROBIN:.....80 g/L

TEBUCONAZOLE.....160 g/L

Aditivos:c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA N° - SENASA
Titular del Registro: **Rotam Agrochemical Perú SA.**

Formulado por:



JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
No. 88 Rotam Rd, ETDZ Kunshan, Jiangsu.
215301 CHINA. www.rotam.com

Importador y Distribuidor:

Softagr®

Soluciones Técnicas del Agro s.a.c

Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado, Perú
Tel.: (511) 336 86 45
Fax: (511) 336 82 99

Contenido Neto: 5 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.: 2 años a partir de la fecha de formulación

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



XSTRATA GOLD 240 SC es un fungicida resultante de la mezcla de los ingredientes activos Azoxystrobin y Tebuconazole, los cuales inhiben la respiración mitocondrial en los hongos e interfieren en la biosíntesis del ergosterol. Presenta acción sistémica y de contacto con amplio espectro de control.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i> (<i>Uncinula necator</i>)	0.20	12	Azoxystrobin = 2 Tebuconazole = 1

P.C: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación por ciclo del cultivo. Aplicar como preventivo al inicio de los síntomas.

PERIODO DE REINGRESO:

Cuando la aplicación haya secado,

COMPATIBILIDAD:

Es recomendable realizar previamente un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso y aplicación dadas por el fabricante.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas."

