

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
- Durante la aplicación evite el contacto directo con el producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada y mantenerlo en reposo hasta que se recupere.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar cuidadosamente con abundante agua fresca.
- En caso de ingestión accidental: No inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: Sulfato de atropina: vía endovenosa o intramuscular en la dosis de 1 a 2 mg en adultos, y 0.5 a 1 mg en niños.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
CICOTOX 0 800 13040

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FARMACRON

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Profenofos..... 720 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A
Av. Alfredo Mendiola 6068. Los Olivos – Lima, Perú.
Teléfono 614 1500 Fax 614 1517



Fabricante y Formulator:

IPROCHEM COMPANY LIMITED.
35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd, Luohu District, Shenzhen CHINA

Contenido Neto: **200L**

N° Lote
Fecha de Fabricación:
Fecha de Expiración:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**

INSTRUCCIONES DE USO:

FARMACRON, es un insecticida no sistémico, de acción estomacal y por contacto elaborado a base de Profenofos, ingrediente activo con un efecto translinar y ovicida.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

FARMACRON, se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plaga		Dosis (mL / 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	250	14	0.02

PC : Periodo de carencia LMR: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, siendo éstos preventivos o tan pronto se observen los primeros insectos a controlar.
Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FARMACRON es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, en el cultivo tratado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

