

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazole (Difenoconazole + Propiconazole)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico.
- Nota al médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040 / 328-7396 Atención las 24 horas CROP BUSINESS S.A.C.: 349-2669
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua por lo menos de 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger inmediatamente el producto y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PRODEFENS 500 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Propiconazole 250 g/L
Difenoconazole 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1506 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301
Urb. Sta. Patricia I Etapa - La Molina - Lima
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 4 L
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower Fortune International Building
N° 359, Hongwu Road - Nanjing
CHINA



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- PRODEFENS 500 EC es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado para el control de "Mancha negra del maíz".
- PRODEFENS 500 EC es un producto formulado a base de 2 ingredientes activos Propiconazole (actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial interfiriendo en el ciclo de vida del hongo) y Difenoconazole (actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol deteniendo el desarrollo del hongo).
- PRODEFENS 500 EC se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Maíz	Mancha negra del maíz	Phyllachora maydis	0.2 - 0.25	7	0.05 ¹ 0.05 ²
Espárrago	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	0.5	240	0.05 ¹ 0.05 ²
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	0.2 - 0.25	30	3.0 ¹ 0.7 ²
Arroz	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	0.2	30	3.0 ¹ 0.7 ²

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuo (ppm: partes por millón)
(1) Difenoconazole (2) Propiconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar la aplicación cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma. Para el cultivo de maíz realizar hasta 2 aplicaciones por campaña y para el cultivo de espárrago sólo una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: PRODEFENS 500 EC no es fitotóxico para el cultivo recomendado en esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD: PRODEFENS 500 EC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

