

CURAMAX[®]

CIMOXANIL + MANCOZEB

CURAMAX[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable - WP

Composición:
Cimoxanil 80 g/kg
Mancozeb 640 g/kg
Aditivos c.s.p. 1/kg

Registro: PQUA N° 850-SENASA

Titular del Registro: ITAGRO S.A.
Importado y distribuido por: ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ
Av. La Fontana N° 1355 Of. 201 La Molina
Telefax: (01) 349-6805
Fabricante y Formulador: SINOCHEM AGRO CO. LTD.
17-19 Th Fl, N°33 Henan Road(s) Shanghai
200002. PR. - CHINA
Telf. 86-21-63181805, Fax: 86-21-63375874

Contenido Neto: 1.0 Kg
N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CURAMAX[®]

CIMOXANIL + MANCOZEB

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Cuidado este producto puede ser dañino si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evite aspirar la neblina de aspersión.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación use guantes, botas, overol de dos piezas, gafas de protección y respirador para ingresar al área tratada.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene en casa de habitación

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Cimoxanil: Acetamida
- Grupo químico: Mancozeb: Ditiocarbamato
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrelle la copia de esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua durante, mínimo 15 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Consulte con un médico.
- En caso de ingestión, inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia.
- No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- **ANTÍDOTO:** No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático. TELÉFONO DE EMERGENCIA: EN CASO DE INTOXICACIÓN (24 horas): CICOTOX 0800-13040
- **INTOXICACIÓN (24 horas):** CICOTOX 0800-13040
- **CISPROQUIM** 0800-50847 Salud en Línea 0801-10200 opción.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en la zona tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (Días)	LMR (PPM)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/OT 200 litros		CIMOXANIL	MANCOZEB
Papa	Bancho o Hielo fungoso o seca seca	Phytophthora infestans	1.5 2.0	0.5	14	0.05	0.2
Quinoa	Midu	Peronospora farinosa	1.5 2.0	0.5	25	0.05	---
Cebolla	Midu	Peronospora destructor	1.5	0.5	18	0.5	1

P.C.: Período de Carenia
LMR: Límite Máximo de Residuos

