21.5 cm

36 cm

TANCAP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Gránulos dispersables (WG)

Composición:

Captan ..... 800 g/kg
Aditivos ..... csp 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro e importador:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N° 401 Of. 610.
Santiago de Surco. Lima- Perú.
Teléfono: 511 713-9960

Formulador:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
6th Floor, Gaoxinjisshuchuangye Centre Shunhua Road 750#,
Jinan, Shandong- China.
Teléfono: 86-531-88875222, Fax: 86-531-88875232

Contenido Neto: 20 Kg

Lote Nº:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

21.5 cm

36 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Phthalimide

- Este producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

En caso de EMERGENCIA llamar a:
CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas),
ESSALUD EN LÍNEA: 411- 8000 (Opción 4) o
CISPROQUIM: 0800-50-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores, ni abejas si se verifica la presencia de éstas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TANCAP es un fungicida de contacto que se aplica de forma preventiva.

Preparación y aplicación

Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida.

La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

La adsorción de **TANCAP** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

- **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda una aplicación por campaña a inicios de floración o cuando se presenten las condiciones favorables para la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L	P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre cientifico			
Mandarina	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	400	7	0.02

P.C. = Periodo de carencia LMR = Límite máximo de residuos