

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Formulador:

Formulaciones Químicas S.A.
CHOMES-Puntarenas
Telf.: 638-8283 - Costa Rica

Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria Lima - Perú
Telf.: 710-4068



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1 kg
Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Útil como protector durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la piretroína
- Si se inhala: Retírese al aire libre inmediatamente o lleve el paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- Si se ingiere: Beba abundante agua y no induzca el vómito. Si el paciente sufre de náuseas, no induzca el vómito.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 105 CISPQUIM: 088-098-447 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido huyale la tunda o bolsa conteniendo. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes de producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos análisis marinos: *Lumnitzera* spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controle insectos mastigadores y minadores.

Dislue la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agite y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulta con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Nombre común	PLAGA	Nombre científico	Kg/ha	DOSIS	%	PC (días)	LMR (ppm)
Alfalfa	Gusano perforador	Heliothis virescens	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
	Mosca minadora		Liriomyza huidobrensis	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
	Gusano minador		Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
	Perforador de la hoja		Bucculatrix thurberella	0.5	----	----	15	0.02
Algodón	Gusano mayor de la hoja	Alabama argillacea	Alabama argillacea	0.5	----	----	15	0.02
	Gusano menor de la hoja		Anastrepha	0.5	----	----	15	0.02
Cebolla	Thrips	Heliothis virescens	Thrips tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Heliothis virescens	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano cogollero		Spodoptera frugiperda	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Copitarsia turbera	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
Espinazo	Thrips	Heliothis virescens	Thrips tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Heliothis virescens	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano cogollero		Spodoptera frugiperda	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Copitarsia turbera	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
Granado	Thrips	Heliothis virescens	Thrips tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Heliothis virescens	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano cogollero		Spodoptera frugiperda	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Copitarsia turbera	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
Papa	Thrips	Heliothis virescens	Thrips tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Heliothis virescens	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano cogollero		Spodoptera frugiperda	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Copitarsia turbera	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
Tomate	Thrips	Heliothis virescens	Thrips tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Heliothis virescens	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano cogollero		Spodoptera frugiperda	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Copitarsia turbera	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
Vid	Thrips	Heliothis virescens	Thrips tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Heliothis virescens	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano cogollero		Spodoptera frugiperda	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Copitarsia turbera	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
Papa	Thrips	Heliothis virescens	Thrips tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Heliothis virescens	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano cogollero		Spodoptera frugiperda	0.1	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano devorador		Copitarsia turbera	0.1	0.1	0.05	N.D.	3

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Período de Cereza

N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con relación a las vainas 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, a su vez y manejo de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



190.00 mm

ET PQUA N°109-96-AG-SENASA/V004-1