

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Perú



Formulador:

Nippon Kayaku Co., Ltd.
1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
NIPPON KAYAKU

Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Tel: 710-4068



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1 kg
Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Evitar el contacto con la piel, la ropa y los alimentos.
- Único ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Analógico de la pirimidina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el producto al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto "fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental: suministrar carbón medicinal.
- En caso de ingestión accidental: suministrar carbón medicinal.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CISPROMQUIM: 080-099-447 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, utilice la funda o bolsa contenedora. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Evitar el contacto con el agua, el suelo, los animales y el cultivo.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: Lumbricaria spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja. O cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y Diura la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulta con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Nombre común	PLAGA	Nombre científico	Kg/ha	Kg/ha	%	PC (días)	LMR (ppm)
Alf. Pimiento	Gusano perforador		Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Mosca minadora		Leptomyza huidobrensis	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano del tallo		Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Perforador de la hoja		Bucculatrix thurberella	0.5	-----	-----	15	0.02
Algodón	Gusano mayor de la hoja		Alabama argillacea	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano menor de la hoja		Anomis texana	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
Cebolla	Thrips		Thrips tabaci	0.1	-----	-----	0.05	0.01
	Gusano devorador		Heliothis virescens	0.1	-----	-----	N.D.	3
Espinazo	Gusano copelero		Spodoptera frugiperda	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano del tallo		Cactaria lunata	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
Granado	Thrips		Thrips tabaci	0.1	-----	-----	0.05	0.01
	Thrips del tallo		Heliothis virescens	0.15-0.20	0.075-0.1	-----	14	3
Papa	Thrips del tallo		Heliothis virescens	0.1	-----	-----	N.D.	3
	Polilla		Tuta absoluta	0.35	-----	-----	15	3
Tomate	Mosca blanca		Bemisia tabaci	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	0.05	0.01
	Thrips		Thrips tabaci	0.1	-----	-----	N.D.	3
Vid	Polilla de la papa		Phthorimaea operculella	0.50	-----	-----	N.D.	0.01
	Thrips		Thrips tabaci	0.20-0.30	-----	-----	N.D.	0.01

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Período de Cereza

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

