

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Perú



Formulador:

Syngenta Crop Protection AG
Suiza

Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Tel: 710-4068



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1 kg
Fecha de vencimiento:

©Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evitar el contacto con la piel, la ropa o el equipo de trabajo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la neristoxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos láveselos con abundante agua tibia y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 105 CISPROMQUIM: 080-090-347 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENWASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenedor utilícelo la tunda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: Lumbricoides spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja. Por su alta actividad a la acción estomacal. Controla insectos mastigadores y minadores.

Disuirla la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Nombre común	PLAGA	Nombre científico	Kg/ha	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
					Kg/ha	%		
Alfalfa	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20			N.D.	3
	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.30-0.40	0.15-0.20			N.D.	3
	Gusano desollador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20			N.D.	3
	Perforador de la hoja	Braconaria thuboroides	0.5				15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	Alabama arripica					N.D.	3
Cebolla	Gusano menor de la hoja	Anthonomus grandis					N.D.	3
	Tripsa	Tripsa tabaci		0.1	0.05		N.D.	3
	Gusano desollador	Heliothis virescens	0.20-0.40	0.10-0.20			N.D.	3
Espinaca	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.20-0.40	0.10-0.20			N.D.	3
	Gusano desollador	Capitata turrita					N.D.	3
	Tripsa	Tripsa tabaci		0.1	0.05		N.D.	3
Granado	Tripsa	Tripsa tabaci		0.15-0.20	0.075-0.1		N.D.	3
	Tripsa delagabito	Heliothis virescens		0.1	0.05		N.D.	3
Papa	Polilla	Tuta absoluta	0.70	0.35			15	3
	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.30-0.40	0.15-0.20			14	3
Vid	Tripsa	Tripsa tabaci		0.1	0.05		N.D.	0.01
	Polilla de la papa	Phthorimaea operculella	0.60				N.D.	0.01
Papa	Tripsa	Tripsa tabaci	0.20-0.30				N.D.	0.01

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón debe efectuarse con estadíos larvales 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvales 1 y 2.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT-S la aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ET POLA N°109-96-AG-SENASA/004-1