

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Formulador:

Formulaciones Químicas S.A.
CHOMES-Puntarenas
Telf.: 638-8283 - Costa Rica

Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 710-4068



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 0.25 kg
Fecha de vencimiento:

©Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar equipo de protección personal: guantes, botas, gafas, mascarilla, oídos y protección para el rostro.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la rotenona
- En caso de contacto con la piel: lavar inmediatamente o lavar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 105 CIPROQUIM: 080-950-947 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contenedora. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las "neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos; Lumbrineria spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos mastigadores y minadores.

Disuelva la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agite y verter esta pre-mezcla en un cilindro en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Nombre común	PLAGA	DOSIS	PC	LMR
Alfalfa	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.
	Mosca minadora	Liriomyza lundblomii	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.
	Gusano esquilador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.
	Perforador de la hoja	Bucculatrix thurberella	0.5	0.1	0.02
Algodón	Gusano mayor de la hoja	Alabama argillacea	0.5	0.1	0.02
	Gusano menor de la hoja	Acanthia leana	0.5	0.1	0.02
Cebolla	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.
	Gusano defoliador	Heliothis virescens	0.1	0.05	N.D.
	Gusano copilero	Spodoptera frugiperda	0.1	0.05	N.D.
	Gusano defoliador	Coplataria turba	0.1	0.05	N.D.
Espárrago	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa del tallo	Heliothis haemorrhoidalis	0.1	0.05	N.D.
	Pollín	Tuta absoluta	0.35	0.1	N.D.
Tomate	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.
Vid	Pollín de la papa	Phthorimaea operculella	0.60	0.1	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.20-0.30	0.1	N.D.
Papa	Tripsa	Tripsa tabaci	0.20-0.30	0.1	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.20-0.30	0.1	N.D.

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Período de Carenza

N.D.: No determinado

PRECAUCIÓN Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación debe realizarse cuando el cultivo esté en plena floración, es decir, cuando el 10% de las plantas estén floreciendo. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos 1 y 2.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este empaque, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



190.00 mm

ET POUA N°109-96-AG-SENASA/V004-250